EXAMEN DU BACCALAUREAT	Epreuve : MATHÉMATIQUES
SESSION DE JUIN 2013	Durée :4H ***** Coefficient : 4
Section : Mathématiques	SESSION PRINCIPALE
Corrigé proposé par : FARID ABIDI ***** Lycée Ibn Khladoun à RADES	

Exercice 1 :

1. (A₁) : Vrai

En effet, si $33n \equiv 0(2013)$ alors il existe un entier relatif k tel que $33n = 2013k = 33 \times 61k$
D'où $n = 61k$ et par suite $n \equiv 0(\text{mod } 61)$.

2. (A₂) : Vrai

En effet, on a : $33 \wedge 11 = 11$ et $2013 = 11 \times 183$ donc 11 divise 2013 donc l'équation $33x + 11y = 2013$ admet des solutions dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

3. (A₃) : Vrai

En effet,

- La fonction ln est dérivable sur $]0, +\infty[$;
- La fonction $t \mapsto \frac{e^t}{1+t^2}$ est continue sur $\mathbb{R}$;
- Pour tout $x > 0$, $\ln x \in \mathbb{R}$
- $1 \in \mathbb{R}$

Donc F est définie et dérivable sur $]0, +\infty[$.

4. (A₄) : Faux

En effet, pour tout $x > 0$, $F'(x) = \frac{1}{x} \cdot \frac{e^{\ln x}}{1+(\ln x)^2} = \frac{x}{x[1+(\ln x)^2]} = \frac{1}{1+(\ln x)^2}$.

Exercice 2 :

A) f est la similitude directe de centre O et qui envoie B en A.

1) On a $(\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OA}) \equiv -(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})[2\pi] \equiv -\frac{\pi}{3}[2\pi]$ donc une mesure de l'angle de f est $-\frac{\pi}{3}$.

Le rapport de f est $\frac{OA}{OB} = \frac{1}{\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)} = 2$.

2) a) On a : $f(A) = C \Leftrightarrow \begin{cases} OC = 2OA \\ (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}) \equiv -\frac{\pi}{3}[2\pi] \end{cases}$ donc le triangle OCA est direct.

La formule d'Al-Kashi donne :

$$AC^2 = OA^2 + OC^2 - 2OA \cdot OC \cdot \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = OA^2 + 4OA^2 - 2OA^2 = 3OA^2$$

$$\text{donc } OA^2 + AC^2 = OA^2 + 3OA^2 = 4OA^2 = OC^2$$

d'où le triangle OCA est rectangle en A.

D'autre part : $f(B) = A$ et $f(A) = C$ donc $AC = 2BA = 2AB$.

b) Voir figure à la page 8-8.

B- g est la similitude indirecte qui envoie B en A et A en C.

1) Soit Ω le centre de g .

a) $g \circ g$ est l'homothétie de centre Ω et de rapport 4 et $g \circ g(B) = g(A) = C$ donc $\overrightarrow{\Omega C} = 4\overrightarrow{\Omega B}$.

b) $\overrightarrow{\Omega C} = 4\overrightarrow{\Omega B} \Leftrightarrow 4\overrightarrow{\Omega B} - \overrightarrow{\Omega C} = \vec{0}$ donc Ω est le barycentre des points pondérés (B, 4) et (C, -1)
donc $\overrightarrow{B\Omega} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.

Voir figure à la page 8-8.

2) a) G est le barycentre de (A, 1) et (B, 2) donc $\overrightarrow{BG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BA}$

$g(B) = A$, $g(G) = H$ et $g(A) = C$, on en déduit : $\overrightarrow{AH} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

b) On a : $\overrightarrow{BG} + \overrightarrow{AH} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} = -\overrightarrow{B\Omega} = \overrightarrow{\Omega B}$.

D'autre part :

$$\overrightarrow{BG} + \overrightarrow{AH} = \overrightarrow{\Omega B} \Leftrightarrow \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{AG} + \overrightarrow{GH} = \overrightarrow{\Omega G} + \overrightarrow{GB}$$

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{G\Omega} = \overrightarrow{GA} + 2\overrightarrow{GB} \Leftrightarrow \overrightarrow{GH} + \overrightarrow{G\Omega} = \vec{0}$$

D'où G est milieu du segment $[\Omega H]$.

c) On a :

- g est une similitude indirecte de centre Ω et de rapport 2
- $g(G) = H$
- G milieu de $[\Omega H] \Leftrightarrow \overrightarrow{\Omega H} = 2\overrightarrow{\Omega G}$

Donc l'axe de g est la droite (GH).

Exercice 3 :

1. a) On a : $\overrightarrow{IJ} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{IK} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ donc $\overrightarrow{IJ} \wedge \overrightarrow{IK} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

b) $\overrightarrow{IJ} \wedge \overrightarrow{IK} \neq \vec{0}$ donc les vecteurs $\overrightarrow{IJ}$ et $\overrightarrow{IK}$ ne sont pas colinéaires donc les points I, J et K déterminent un plan (P).

$\overrightarrow{IJ} \wedge \overrightarrow{IK} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ est un vecteur normal à (P) donc P : $x - y + z + d = 0$ où d est un réel.

Comme I(1, 1, 0) appartient à (P) alors $1 - 1 + 0 + d = 0$ donc $d = 0$.

Par suite, le plan P est d'équation cartésienne $x - y + z = 0$.

2) On a : $\vec{IS} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $(\vec{IJ} \wedge \vec{IK}) \cdot \vec{IS} = 0 + 2 + 1 = 3$ donc le volume du tétraèdre SIJK est

$$V = \frac{1}{6} |(\vec{IJ} \wedge \vec{IK}) \cdot \vec{IS}| = \frac{1}{6} \cdot 3 = \frac{1}{2}.$$

$$\begin{aligned} 3) \text{ a) } \vec{MJ} \wedge \vec{MK} &= (\vec{MI} + \vec{IJ}) \wedge (\vec{MI} + \vec{IK}) = \vec{MI} \wedge \vec{MI} + \vec{MI} \wedge \vec{IK} + \vec{IJ} \wedge \vec{MI} + \vec{IJ} \wedge \vec{IK} \\ &= \vec{MI} \wedge \vec{MI} + \vec{MI} \wedge \vec{IK} - \vec{MI} \wedge \vec{IJ} + \vec{IJ} \wedge \vec{IK} \\ &= \vec{0} + \vec{MI} \wedge (\vec{IK} - \vec{IJ}) + \vec{IJ} \wedge \vec{IK} = \vec{MI} \wedge \vec{JK} + \vec{IJ} \wedge \vec{IK} \end{aligned}$$

Or M appartient à la droite (Δ) , alors les vecteurs $\vec{MI}$ et $\vec{JK}$ sont colinéaires donc $\vec{MI} \wedge \vec{JK} = \vec{0}$.

Par suite : $\vec{MJ} \wedge \vec{MK} = \vec{0} + \vec{IJ} \wedge \vec{IK} = \vec{IJ} \wedge \vec{IK}$.

b) Le volume du tétraèdre SIJK est : $V' = \frac{1}{6} |(\vec{MJ} \wedge \vec{MK}) \cdot \vec{MS}| = \frac{1}{6} |(\vec{IJ} \wedge \vec{IK}) \cdot \vec{MS}|$

Or, une représentation paramétrique de la droite (Δ) est $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t, t \in \mathbb{R} \\ z = -2t \end{cases}$

Ainsi, $M(1+t, 1-t, -2t)$ et $\vec{MS} \begin{pmatrix} -t \\ -2+t \\ 1+2t \end{pmatrix}$.

D'où $(\vec{IJ} \wedge \vec{IK}) \cdot \vec{MS} = -t - (-2+t) + (1+2t) = 3$ donc $V' = \frac{1}{2}$.

Remarque :

$$V' = \frac{1}{6} |(\vec{MJ} \wedge \vec{MK}) \cdot \vec{MS}| = \frac{1}{6} |(\vec{IJ} \wedge \vec{IK}) \cdot \vec{MS}| = \frac{1}{6} |(\vec{IJ} \wedge \vec{IK}) \cdot (\vec{MI} + \vec{IS})| = \frac{1}{6} |(\vec{IJ} \wedge \vec{IK}) \cdot \vec{MI} + (\vec{IJ} \wedge \vec{IK}) \cdot \vec{IS}|$$

Or $\vec{IJ} \wedge \vec{IK}$ est orthogonal à chacun des vecteurs $\vec{IJ}$ et $\vec{IK}$, donc $\vec{IJ} \wedge \vec{IK}$ est orthogonal à tout vecteur du plan (P) d'où $\vec{IJ} \wedge \vec{IK}$ est orthogonal au vecteur $\vec{JK}$. Comme les vecteurs $\vec{MI}$ et $\vec{JK}$, alors $(\vec{IJ} \wedge \vec{IK}) \cdot \vec{MI} = 0$.

$$\text{Ainsi, } V' = \frac{1}{6} |(\vec{IJ} \wedge \vec{IK}) \cdot \vec{IS}| = V = \frac{1}{2}.$$

4) a) $P' = h(P)$ est le plan parallèle au plan (P) passant par $O' = h(O)$

$$\text{Posons } O'(x', y', z') \text{ , } O' = h(O) \Leftrightarrow \overrightarrow{SO'} = 2\overrightarrow{SO} \Leftrightarrow \begin{cases} x-1 = -2 \\ y+1 = 2 \\ z-1 = -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 1 \\ z = -1 \end{cases} .$$

Donc $O'(-1, 1, -1)$.

Remarque : l'expression analytique de h est $\begin{cases} x' = 2x + (1-2)x_s \\ y' = 2y + (1-2)y_s \\ z' = 2z + (1-2)z_s \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = 2x - 1 \\ y' = 2y + 1 \\ z' = 2z - 1 \end{cases}$ donc les

coordonnées de $O' = h(O)$ sont $(-1, 1, -1)$.

$P' // P$ donc $P' : x - y + z + d' = 0$ avec d' est un réel.

$$O'(-1, 1, -1) \in P' \Leftrightarrow -1 - 1 - 1 + d' = 0 \Leftrightarrow d' = 3 .$$

Ainsi, $P' : x - y + z + 3 = 0$.

b) Remarquons que : $M' = h(M)$, $J' = h(J)$, $K' = h(K)$ et $S = h(S)$

$$\text{donc } \overrightarrow{M'J'} = 2\overrightarrow{MJ} \text{ , } \overrightarrow{M'K'} = 2\overrightarrow{MK} \text{ et } \overrightarrow{M'S} = 2\overrightarrow{MS} .$$

Le volume du solide $MJKM'J'K'$ est :

$$\begin{aligned} V'' &= \frac{1}{6} |(\overrightarrow{M'J'} \wedge \overrightarrow{M'K'}) \cdot \overrightarrow{M'S}| - V' = \frac{1}{6} |((2\overrightarrow{MJ}) \wedge (2\overrightarrow{MK})) \cdot (2\overrightarrow{MS})| - V \\ &= \frac{8}{6} |(\overrightarrow{MJ} \wedge \overrightarrow{MK}) \cdot \overrightarrow{MS}| - V = 8V - V = 7V = \frac{7}{2} \end{aligned}$$

Exercice 4 :

1) a) $\text{Aff}(\overrightarrow{EM}) = (1 + e^{i\theta}) - 1 = e^{i\theta}$ et $\text{Aff}(\overrightarrow{FN}) = i(1 + e^{i\theta}) - i = ie^{i\theta}$.

b) Pour tout réel θ de $[0, 2\pi[$, $EM = |e^{i\theta}| = 1$ donc M varie sur le cercle C_1

et $FN = |ie^{i\theta}| = |i| \cdot |e^{i\theta}| = 1$ donc F varie sur le cercle C_2 .

$$\frac{\text{Aff}(\overrightarrow{FN})}{\text{Aff}(\overrightarrow{EM})} = \frac{ie^{i\theta}}{e^{i\theta}} = i \text{ est imaginaire donc les vecteurs } \overrightarrow{EM} \text{ et } \overrightarrow{FN} \text{ sont orthogonaux d'où les}$$

droites (EM) et (FN) sont perpendiculaires.

2) a) $\frac{\text{Aff}(\overrightarrow{EP})}{\text{Aff}(\overrightarrow{EM})} = \frac{(1-i)\sin\theta \cdot e^{i\theta} - 1}{e^{i\theta}} = (1-i)\sin\theta - e^{-i\theta}$
 $= \sin\theta - i\sin\theta - \cos\theta + i\sin\theta = \sin\theta - \cos\theta$

$$\frac{\text{Aff}(\overrightarrow{FP})}{\text{Aff}(\overrightarrow{FN})} = \frac{(1-i)\sin\theta e^{i\theta} - i}{ie^{i\theta}} = \frac{(1-i)\sin\theta - ie^{-i\theta}}{i} = (-1-i)\sin\theta - e^{-i\theta}$$

$$= -\sin\theta - i\sin\theta - \cos\theta + i\sin\theta = -\sin\theta - \cos\theta$$

b) $\frac{\text{Aff}(\overrightarrow{EP})}{\text{Aff}(\overrightarrow{EM})}$ est réel donc les vecteurs $\overrightarrow{EP}$ et $\overrightarrow{EM}$ sont colinéaires d'où P appartient à la droite (EM).

$\frac{\text{Aff}(\overrightarrow{FP})}{\text{Aff}(\overrightarrow{FN})}$ est réel donc les vecteurs $\overrightarrow{FP}$ et $\overrightarrow{FN}$ sont colinéaires d'où P appartient à la droite (FN).

Exercice 5 :

I- 1) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \varphi(x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + e^{-x}} = 1$.

La droite des abscisses est asymptote à la courbe C_φ au voisinage de $-\infty$.

La droite d'équation $y = 1$ est asymptote à la courbe C_φ au voisinage de $+\infty$.

b) Le tableau suivant donne le signe de $e^x - 1$ pour tout x réel ,

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$e^x - 1$	-	0	+

Il en résulte : $\lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 0^-} \varphi(x) = -\infty$.

La droite des ordonnées est asymptote à la courbe C_φ .

c) φ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et pour tout x réel non nul , $\varphi'(x) = \frac{-e^x}{(e^x - 1)^2} < 0$ donc φ est

strictement décroissante sur chacun des intervalles $]-\infty, 0[$ et $]0, +\infty[$.

2) On pose , pour tout x réel non nul , $h(x) = \varphi(x) - x$.

Remarquons que pour tout x réel non nul , $h'(x) = \varphi'(x) - 1 < 0$.

- h est continue et strictement décroissante sur $]-\infty, 0[$,
- $h(]-\infty, 0[) =]\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x), \lim_{x \rightarrow -\infty} h(x)[= \mathbb{R}$
- $0 \in \mathbb{R}$
- Donc l'équation $\varphi(x) = x$ admet une unique solution α dans l'intervalle $]-\infty, 0[$

De même :

- h est continue et strictement décroissante sur $]0, +\infty[$,
- $h(]0, +\infty[) =]\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x), \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x)[= \mathbb{R}$
- $0 \in \mathbb{R}$
- Donc l'équation $\varphi(x) = x$ admet une unique solution β dans l'intervalle $]0, +\infty[$

II- 1) a) On a pour tout x réel , $f(x) = e^x - x$ donc $f'(x) = e^x - 1$

$$\Delta_a : y = f'(a) \cdot (x - a) + f(a) \Leftrightarrow \Delta_a : y = (e^a - 1)(x - a) + e^a - a$$

$$\Leftrightarrow \Delta_a : y = (e^a - 1)x + (1 - a)e^a$$

On a pour tout $x > 0$, $g(x) = 1 - x + \ln x$ donc $g'(x) = -1 + \frac{1}{x} = \frac{1 - x}{x}$

$$D_b : y = g'(b) \cdot (x - b) + g(a) \Leftrightarrow D_b : y = \left(\frac{1-b}{b} \right) (x - b) + 1 - b + \ln b$$

$$\Leftrightarrow \Delta_a : y = \left(\frac{1-b}{b} \right) x + \ln b$$

$$b) \Delta_a // D_b \Leftrightarrow e^a - 1 = \frac{1-b}{b} \Leftrightarrow e^a = \frac{1}{b} \Leftrightarrow b = e^{-a}.$$

2) On suppose que $b = e^{-a}$ donc $\Delta_a // D_b$.

$$a) \Delta_a = D_b \Leftrightarrow e^a(1-a) = \ln b \Leftrightarrow e^a(1-a) = -a \Leftrightarrow e^a = a(e^a - 1)$$

Comme $e^a \neq 0$, alors $a(e^a - 1) \neq 0$ donc $a \neq 0$; il en résulte :

$$\Delta_a = D_b \Leftrightarrow e^a = a(e^a - 1) \Leftrightarrow a \neq 0 \text{ et } a = \frac{e^a}{e^a - 1}.$$

$$b) \Delta_a = D_b \Leftrightarrow e^a = a(e^a - 1) \Leftrightarrow a \neq 0 \text{ et } a = \frac{e^a}{e^a - 1} \Leftrightarrow a \neq 0 \text{ et } a = \varphi(a) \Leftrightarrow a = \alpha$$

pour $a = \alpha$, on a : $b = e^{-\alpha}$, donc $\Delta_\alpha = D_{e^{-\alpha}}$.

Donc Δ_α est tangente aux courbes C_f et C_g respectivement aux points $A(\alpha, f(\alpha))$ et

$B(e^{-\alpha}, g(e^{-\alpha}))$.

c) Comme l'équation $\varphi(x) = x$ admet une unique solution β dans l'intervalle $]0, +\infty[$ alors Δ_β est tangente aux courbes C_f et C_g respectivement aux points $A(\beta, f(\beta))$ et $B(e^{-\beta}, g(e^{-\beta}))$.

3) a) Voir figure à la page 8-8

b) $f(-\alpha) - \alpha = e^{-\alpha} - (-\alpha) - \alpha = e^{-\alpha}$. Voir figure à la page 8-8

c) Voir figure à la page 8-8

Figure de l'exercice 2

Figure de l'exercice 5