

Exercice 1 (6 points)

EFGH est un rectangle tel que $EF = 6$ et $EH = 2$


M est le milieu de $[FG]$

$K \in [GH]$ et $HK = 2$

$L \in [EF]$ et $LF = 0,5$

N est le projeté orthogonal de K sur (EM)

Les 2 questions sont indépendantes.




1.
 - a. Calculer les longueurs EK et EM (valeurs exactes)
 - b. En décomposant les 2 vecteurs, calculer le produit scalaire $\vec{EK} \cdot \vec{EM}$
 - c. Calculer une valeur approchée au degré près de l'angle $\widehat{KEM}$
 - d. En utilisant le produit scalaire $\vec{EK} \cdot \vec{EM}$, calculer EN. (valeurs exactes)
2. On se place dans le repère orthogonal $\left(E, \frac{1}{6} \vec{EF}, \frac{1}{2} \vec{EH}\right)$.
 - a. Donner les coordonnées des points K, M, G et L
 - b. Démontrer que (KM) et (GL) sont perpendiculaires.

Exercice 2: (6 points)

AIL est un triangle équilatéral dans le sens direct.

ABL et CIL sont 2 triangles rectangles et isocèles.

1.
 - a. Trouver la mesure principale des angles orientés $(\vec{AB}, \vec{AL})$ et $(\vec{AL}, \vec{AI})$
 - b. Trouver la mesure de l'angle géométrique $\widehat{AIC}$
 - c. Trouver la mesure de l'angle géométrique $\widehat{IAC}$ puis en déduire la mesure principale de l'angle orienté $(\vec{AI}, \vec{AC})$
 - d. Calculer $(\vec{AB}, \vec{AC})$ en utilisant la relation de Chasles. Que peut-on en déduire
2. Trouver la mesure principale des angles orientés suivants $(\vec{LC}, \vec{LA})$; $(\vec{BL}, \vec{AL})$ et $(\vec{IL}, \vec{LB})$



Exercice 1 :

1.

a. A l'aide du théorème de Pythagore dans le triangle rectangle EHK :

$$EK^2 = EH^2 + HK^2 = 4 + 4 = 8 \text{ donc } EK = \sqrt{8} = \boxed{2\sqrt{2}}$$

$$\text{De même } EM^2 = EF^2 + FM^2 = 36 + 1 = 37. \text{ EM} = \boxed{\sqrt{37}}$$

$$\text{b. } \overrightarrow{EK} \cdot \overrightarrow{EM} = (\overrightarrow{EH} + \overrightarrow{HK}) \cdot (\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FM}) = \overrightarrow{EH} \cdot \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{EH} \cdot \overrightarrow{FM} + \overrightarrow{HK} \cdot \overrightarrow{EF} + \overrightarrow{HK} \cdot \overrightarrow{FM}$$

$$\overrightarrow{EH} \perp \overrightarrow{EF} \text{ donc } \overrightarrow{EH} \cdot \overrightarrow{EF} = 0$$

$$\overrightarrow{EH} \text{ et } \overrightarrow{FM} \text{ sont colinéaires et de même sens donc } \overrightarrow{EH} \cdot \overrightarrow{FM} = EH \times FM = 2 \times 1 = 2$$

$$\overrightarrow{HK} \text{ et } \overrightarrow{EF} \text{ sont colinéaires et de même sens donc } \overrightarrow{HK} \cdot \overrightarrow{EF} = HK \times EF = 2 \times 6 = 12$$

$$\overrightarrow{HK} \perp \overrightarrow{FM} \text{ donc } \overrightarrow{HK} \cdot \overrightarrow{FM} = 0$$

$$\text{On en déduit que } \overrightarrow{EK} \cdot \overrightarrow{EM} = 0 + 2 + 12 + 0 = \boxed{14}$$

$$\text{c. } \overrightarrow{EK} \cdot \overrightarrow{EM} = EK \times EM \times \cos \widehat{KEM} \text{ donc } 14 = \sqrt{8} \times \sqrt{37} \times \cos \widehat{KEM} \text{ ou } 14 = \sqrt{296} \times \cos \widehat{KEM}$$

$$\cos \widehat{KEM} = \frac{14}{\sqrt{296}} \text{ donc } \boxed{\widehat{KEM} \approx 36^\circ}$$

$$\text{d. } \overrightarrow{EK} \cdot \overrightarrow{EM} = \overrightarrow{EN} \cdot \overrightarrow{EM} \text{ (K se projette orthogonalement en N sur (EM))}$$

$$= EN \times EM \text{ (}\overrightarrow{EN} \text{ et } \overrightarrow{EM} \text{ sont 2 vecteurs colinéaires de même sens)}$$

$$\text{Donc } 14 = EN \times \sqrt{37}, \text{ c'est à dire } \boxed{EN = \frac{14}{\sqrt{37}}}$$

2. a. K(2 ; 2) ; M(6 ; 1) ; G(6 ; 2) et L(5,5 ; 0)

$$\text{b. } \overrightarrow{KM} \begin{pmatrix} 6-2 \\ 1-2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \overrightarrow{KM} \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{GL} \begin{pmatrix} 5,5-6 \\ 0-2 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \overrightarrow{GL} \begin{pmatrix} -0,5 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\overrightarrow{KM} \cdot \overrightarrow{GL} = xx' + yy' = 4 \times (-0,5) + (-1) \times (-2) = -2 + 2 = 0$$

$$\text{On en déduit que } \boxed{(\overrightarrow{KM}) \perp (\overrightarrow{GL})}$$

Exercice 2:

1. a. Le triangle ABL est rectangle et isocèle donc $\widehat{BAL} = 45^\circ = \frac{\pi}{4}$ rad.

On en déduit que $(\vec{AB}, \vec{AL}) = -\frac{\pi}{4}$ rad.

Le triangle AIL est équilatéral donc $\widehat{IAL} = 60^\circ = \frac{\pi}{3}$ rad.

On en déduit que $(\vec{AL}, \vec{AI}) = -\frac{\pi}{3}$ rad.

$$\text{b. } \widehat{AIC} = \widehat{LIC} - \widehat{LIA} = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{3} = \frac{3\pi}{6} - \frac{2\pi}{6} = \frac{\pi}{6} \text{ rad.}$$

c. Le triangle IAC est isocèle donc $\widehat{IAC} = \widehat{ICA} = \frac{\pi - \widehat{AIC}}{2} = \frac{1}{2} \left(\pi - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{5\pi}{6} \right) = \frac{5\pi}{12}$

On en déduit que $(\vec{AI}, \vec{AC}) = -\frac{5\pi}{12}$

$$\begin{aligned} \text{d. } (\vec{AB}, \vec{AC}) &= (\vec{AB}, \vec{AL}) + (\vec{AL}, \vec{AI}) + (\vec{AI}, \vec{AC}) = -\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3} - \frac{5\pi}{12} = -\frac{3\pi}{12} - \frac{4\pi}{12} - \frac{5\pi}{12} \\ &= -\frac{12\pi}{12} = -\pi. \end{aligned}$$

La mesure principale de $(\vec{AB}, \vec{AC})$ est π rad.

Les vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires et de sens contraire.

On en déduit que les points A, B et C sont alignés.

$$2. (\vec{LC}, \vec{LA}) = (\vec{LC}, \vec{LI}) + (\vec{LI}, \vec{LA}) = \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{3} = \frac{3\pi}{12} - \frac{4\pi}{12} = -\frac{\pi}{12} \text{ rad.}$$

$$(\vec{BL}, \vec{AL}) = (-\vec{LB}, -\vec{LA}) = (\vec{LB}, \vec{LA}) = \frac{\pi}{2} \text{ rad.}$$

$$\begin{aligned} (\vec{IL}, \vec{LB}) &= (-\vec{LI}, \vec{LB}) = \pi + (\vec{LI}, \vec{LB}) = \pi + (\vec{LI}, \vec{LA}) + (\vec{LA}, \vec{LB}) = \pi - \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{2} \\ &= \frac{6\pi}{6} - \frac{2\pi}{6} - \frac{3\pi}{6} = \frac{\pi}{6} \text{ rad} \end{aligned}$$