Exercice 1 : (4 points)

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

1. Démontrer le théorème suivant :

Si k un réel non nul et Ω le point d'affixe ω , alors l'écriture complexe de l'homothétie h de centre Ω et de rapport k est $z' = kz + (1-k)\omega$.

2. On note A et B les points d'affixes respectives -1 et 1 . Répondre par Vrai ou Faux aux propositions suivantes en justifiant la réponse.

a) Si h est l'homothétie de centre A est de rapport $-\frac{2}{3}$ alors h est la similitude directe de centre A , de rapport $\frac{2}{3}$ et d'angle π .

b) Si h_1 est l'homothétie de centre A est de rapport $\frac{2}{3}$ et h_2 est l'homothétie de centre de centre B et de rapport $\frac{3}{2}$ alors $h_2 \circ h_1$ est la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.

c) Si f est l'homothétie de centre A est de rapport 3 et g est l'homothétie de centre B et de rapport $\frac{1}{5}$ alors $g \circ f$ est l'homothétie de rapport $\frac{3}{5}$ et de centre C d'affixe 3 .

Exercice 2 : (5 points)

1. Recopier et compléter le tableau suivant :

a	3	5	7
Le reste de a^3 modulo 31			

2. a- Montrer que $7^{30} \equiv 1 \pmod{31}$.

b- Dédurre de ce qui précède que le reste de la division euclidienne de 7^{2013} par 31 est 2.

3. Déterminer le reste modulo 31 du nombre $7^{2013} - 2 \times 3^{2013} + 5^{2013}$.

Exercice 3 : (5 points)

Dans le plan orienté dans le sens direct, on considère un triangle équilatéral direct

ABC de centre G . On désigne par O le milieu de $[BC]$ et par F celui de $[AC]$.

Soit S la similitude directe qui transforme A en B et G en C .

1. a- Déterminer le rapport et un angle de S .

b- Démontrer que F est le centre de S .

2. a- Déterminer la droite (Δ) image de (AB) par S.
 b- Construire le point D image de B par S.
3. a- Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $h = S \circ S$.
 b- Exprimer $\overrightarrow{FD}$ en fonction de $\overrightarrow{FA}$.

Exercice 4 : (6 points)

On considère les fonctions f et F définie sur l'intervalle $[0, 1[$ par $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ et $F(x) = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$.

On donne ci-joint à la page 3-3, la courbe représentative (C) de f dans le plan rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Soit G la fonction définie sur l'intervalle $I = \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ par $G(x) = \int_0^{\sin x} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$.
- a) Montrer que G est dérivable sur I et calculer $G'(x)$ pour tout x de I . En déduire $G(x)$ pour tout x de I .
 b) Calculer l'aire, en unités d'aire, de la partie du plan limitée par (C), l'axe des abscisses et les droites d'équations respectives $x = 0$ et $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.
2. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \geq 1$, par $u_n = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{t^n}{\sqrt{1-t^2}} dt$.
- a) Vérifier que : $u_1 = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$.
- b) Montrer, à l'aide d'une intégration par parties, que : $u_2 = -\frac{1}{2} + \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \sqrt{1-t^2} dt$.
 En déduire que : $u_2 = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}$.
- c) Montrer que pour tout $n \geq 1$, $\frac{1}{(n+1)(\sqrt{2})^{n+1}} \leq u_n \leq \frac{1}{(n+1)(\sqrt{2})^n}$. En déduire que la suite (u_n) converge et donner sa limite.
3. a) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur intervalle J que l'on précisera. Tracer avec soin la courbe représentative (C') de f^{-1} sur l'annexe ci-joint.
 b) Expliciter $f^{-1}(x)$ pour tout x de J .
 c) Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On note A et B les points de la courbe représentative de f^{-1} d'abscisses respectives 1 et 2.
 Calculer le volume V engendré par rotation autour de l'axe des abscisses de l'arc AB.

Annexe à compléter et à rendre avec la copie

Nom de l'élève :

Exercice 1 :

1. h est l'homothétie de centre Ω d'affixe ω et de rapport k .

Pour tout point M d'affixe z , on pose M' d'affixe z' tel que $M' = h(M)$.

$$h(M) = M' \Leftrightarrow \overline{\Omega M'} = k \overline{\Omega M} \Leftrightarrow z' - \omega = k(z - \omega) \Leftrightarrow z' = k(z - \omega) + \omega \Leftrightarrow z' = kz + (1 - k)\omega.$$

Ainsi l'écriture complexe de h est : $z' = kz + (1 - k)\omega$.

3. On note A et B les points d'affixes respectives -1 et 1 . Répondre par Vrai ou Faux aux propositions suivantes en justifiant la réponse.

a) **Vrai**

En effet : Si h est l'homothétie de centre A est de rapport $-\frac{2}{3}$

$$\text{alors } h = h_{\left(\Omega, \frac{2}{3}\right)} \circ h_{(\Omega, -1)} = h_{\left(\Omega, \frac{2}{3}\right)} \circ S_{\Omega} = h_{\left(\Omega, \frac{2}{3}\right)} \circ r_{(\Omega, \pi)}$$

donc h est la similitude directe de centre A , de rapport $\frac{2}{3}$ et d'angle π .

b) **Faux.**

En effet :

l'écriture complexe de h_1 l'homothétie de centre A et de rapport $\frac{2}{3}$ est $z' = \frac{2}{3}z + \left(1 - \frac{2}{3}\right) \times (-1) = \frac{2}{3}z - \frac{1}{3}$

l'écriture complexe de h_2 l'homothétie de centre B et de rapport $\frac{3}{2}$ est $z' = \frac{3}{2}z + \left(1 - \frac{3}{2}\right) \times 1 = \frac{3}{2}z - \frac{1}{2}$

il en résulte que l'écriture complexe de $h_2 \circ h_1$ est : $z' = \frac{3}{2} \left(\frac{2}{3}z - \frac{1}{3} \right) - \frac{1}{2} = z - 1$ donc $h_2 \circ h_1$ est la

translation de vecteur $-\vec{u}$.

c) **Vrai**

En effet :

l'écriture complexe de f l'homothétie de centre A et de rapport 3 est $z' = 3z + (1 - 3) \times (-1) = 3z + 2$

l'écriture complexe de g l'homothétie de centre B et de rapport $\frac{1}{5}$ est $z' = \frac{1}{5}z + \left(1 - \frac{1}{5}\right) \times 1 = \frac{1}{5}z + \frac{4}{5}$

il en résulte que l'écriture complexe de $g \circ f$ est : $z' = \frac{1}{5}(3z + 2) + \frac{4}{5} = \frac{3}{5}z + \frac{6}{5}$ donc $g \circ f$ est l'homothétie

de rapport $\frac{3}{5}$ et de centre C d'affixe $\frac{\frac{6}{5}}{1 - \frac{3}{5}} = \frac{6}{2} = 3$.

Exercice 2 :

1. Recopier et compléter le tableau suivant :

a	3	5	7
Le reste de a^3 modulo 31	27	1	2

2. a- 31 est un nombre premier et 31 ne divise pas 7 donc $7^{30} \equiv 1 \pmod{31}$.

b- On a $2013 = 67 \times 30 + 3$ donc $7^{2013} \equiv 7^{67 \times 30 + 3} \pmod{31} \equiv (7^{30})^{67} \times 7^3 \pmod{31} \equiv 2 \pmod{31}$ d'où le reste de la division euclidienne de 7^{2013} par 31 est 2.

3. 31 est un nombre premier et 31 ne divise pas 3 donc $3^{30} \equiv 1 \pmod{31}$.

De même : 31 est un nombre premier et 31 ne divise pas 5 donc $5^{30} \equiv 1 \pmod{31}$.

Donc $3^{2013} \equiv 3^{67 \times 30 + 3} \pmod{31} \equiv (3^{30})^{67} \times 3^3 \pmod{31} \equiv 1 \pmod{31}$

Et $5^{2013} \equiv 5^{67 \times 30 + 3} \pmod{31} \equiv (5^{30})^{67} \times 5^3 \pmod{31} \equiv 2 \pmod{31}$

Il ne résulte : $7^{2013} - 2 \times 3^{2013} + 5^{2013} \equiv 2 - 2 \times 1 + 2 \pmod{31} \equiv 2 \pmod{31}$.

Par suite , le reste modulo 31 du nombre $7^{2013} - 2 \times 3^{2013} + 5^{2013}$ est 2.

Exercice 3 :

Soit S la similitude directe qui transforme A en B et G en C.

$$1. a- \frac{BC}{AG} = \frac{BC}{\frac{2}{3}AO} = \frac{BC}{\frac{2}{3}AB \frac{\sqrt{3}}{2}} = \sqrt{3}, \quad (\overrightarrow{AG}, \overrightarrow{BC}) \equiv (\overrightarrow{AO}, \overrightarrow{BO})[2\pi] \equiv (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB})[2\pi] \equiv \frac{\pi}{2}[2\pi].$$

Donc le rapport de S est $\sqrt{3}$ et son angle est $\frac{\pi}{2}$.

b- Soit Ω le centre de S,

1^{ère} méthode :

$S(G) = C$ et $S(A) = B$, d'où $(\overrightarrow{\Omega G}, \overrightarrow{\Omega C}) \equiv \frac{\pi}{2}(2\pi)$ et $(\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega B}) \equiv \frac{\pi}{2}(2\pi)$ donc Ω est le point d'intersection

autre que O des deux cercles de diamètres respectifs [AB] et [GC] car $(\overrightarrow{OG}, \overrightarrow{OC}) \equiv -\frac{\pi}{2}(2\pi)$, donc F est le centre de S.

2^{ème} méthode :

On a :

d'une part $S(A) = B$ et $S(G) = C$ et d'autre part

$$\frac{FB}{FA} = \frac{AC \frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}AC} = \sqrt{3} \quad \text{et} \quad (\overrightarrow{FA}, \overrightarrow{FB}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi] \quad \frac{FC}{FG} = \frac{\frac{1}{2}AC}{\frac{1}{3}AC \frac{\sqrt{3}}{2}} = \sqrt{3} \quad \text{et} \quad (\overrightarrow{FA}, \overrightarrow{FB}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi].$$

Donc F est le centre de S.

2.a- la droite (Δ) image de (AB) par S est la perpendiculaire à (AB) passant par S(A) = B

b- S(B) = D appartient à S((AB)) = Δ et S(B) = D implique $(\overrightarrow{FB}, \overrightarrow{FD}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$ donc D appartient à (AC). Ainsi, D est le point d'intersection de Δ et (AC).

3.a- $S \circ S$ est la similitude de centre F et de rapport $(\sqrt{3})^2 = 3$ et $\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$, donc $S \circ S$ est l'homothétie de centre F et de rapport -3.

b- $S \circ S(A) = S(B) = D$ donc $\overrightarrow{FD} = -3\overrightarrow{FA}$.

Exercice 4 :

On considère les fonctions f et F définie sur l'intervalle $[0, 1[$ par $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ et $F(x) = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$.

1. Soit G la fonction définie sur l'intervalle $I = \left[0, \frac{\pi}{2}\right[$ par $G(x) = \int_0^{\sin x} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}}$.

a- La fonction $u: x \mapsto \sin x$ est dérivable sur I, pour tout x de I, $u(x) \in [0, 1[$ et f est continue sur $[0, 1[$ donc G est dérivable sur I et pour tout x de I, $G'(x) = \cos x \cdot f(\sin x) = \cos x \cdot \frac{1}{|\cos x|} = \frac{\cos x}{\cos x} = 1$.

De plus, $G(0) = \int_0^0 \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = 0$, on en déduit que G est la primitive sur I de la fonction $t \mapsto 1$ qui

s'annule en 0 d'où pour tout x de I, $G(x) = \int_0^x dt = x$.

b- Calculer l'aire, en unités d'aire, de la partie du plan limitée par (C), l'axe des abscisses et les droites

d'équations respectives $x = 0$ et $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ est égale à $\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = \int_0^{\sin \frac{\pi}{4}} \frac{dt}{\sqrt{1-t^2}} = G\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\pi}{4}$.

2. Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \geq 1$, par $u_n = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{t^n}{\sqrt{1-t^2}} dt$.

a- $u_1 = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} dt = \left[-\sqrt{1-t^2} \right]_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$.

b- On a : $u_2 = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{t^2}{\sqrt{1-t^2}} dt$.

On pose : $f(t) = t$; $f'(t) = 1$

$$g'(t) = \frac{t}{\sqrt{1-t^2}} \quad ; \quad g(t) = -\sqrt{1-t^2}$$

On obtient :

$$u_2 = \left[-t\sqrt{1-t^2} \right]_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} + \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \sqrt{1-t^2} dt = -\frac{1}{2} + \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \sqrt{1-t^2} dt .$$

$$\text{D'où } u_2 = -\frac{1}{2} + \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \sqrt{1-t^2} dt = -\frac{1}{2} + \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{1-t^2}{\sqrt{1-t^2}} dt = -\frac{1}{2} + \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt - u_2 = -\frac{1}{2} + \frac{\pi}{4} + u_2$$

$$\text{On en déduit : } 2u_2 = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \Leftrightarrow u_2 = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4} .$$

$$\text{c- } 0 \leq t \leq \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow 0 \leq t^2 \leq \frac{1}{2} \Rightarrow -\frac{1}{2} \leq -t^2 \leq 0 \Rightarrow \frac{1}{2} \leq 1-t^2 \leq 1 \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} \leq \sqrt{1-t^2} \leq 1 \Rightarrow 1 \leq \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} \leq \sqrt{2} .$$

Pour tout t de $\left[0, \frac{\sqrt{2}}{2}\right]$ et pour tout $n \geq 1$, $t^n \leq \frac{t^n}{\sqrt{1-t^2}} \leq t^n \sqrt{2}$ donc

$$\int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} t^n dt \leq \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \frac{t^n}{\sqrt{1-t^2}} dt \leq \sqrt{2} \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} t^n dt \Leftrightarrow \left[\frac{1}{n+1} x^{n+1} \right]_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \leq u_n \leq \sqrt{2} \left[\frac{1}{n+1} x^{n+1} \right]_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

$$\text{Ainsi , pour tout } n \geq 1, \frac{1}{(n+1)(\sqrt{2})^{n+1}} \leq u_n \leq \frac{1}{(n+1)(\sqrt{2})^n} .$$

Comme $\sqrt{2} > 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)(\sqrt{2})^{n+1} = +\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (n+1)(\sqrt{2})^n = +\infty$

D'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{(n+1)(\sqrt{2})^{n+1}} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{(n+1)(\sqrt{2})^n} = 0$; il en résulte que la suite (u_n) converge et

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0 .$$

3. a- f est continue et strictement croissante sur I donc f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur intervalle $J = f(I) = \left[f(0), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[= [1, +\infty[$.

La courbe représentative (C') de f^{-1} est le symétrique de (C) par rapport à la droite $\Delta : y = x$.

$$\text{b- } \begin{cases} x \in I \\ y = f(x) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y \in J \\ f^{-1}(y) = x \end{cases}$$

$$f(x) = y \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = y \Leftrightarrow \sqrt{1-x^2} = \frac{1}{y} \Leftrightarrow 1-x^2 = \frac{1}{y^2} \Leftrightarrow x^2 = 1 - \frac{1}{y^2} \Leftrightarrow |x| = \sqrt{\frac{y^2-1}{y^2}}$$

$$\text{D'où } x = \sqrt{\frac{y^2-1}{y^2}} . \text{ Ainsi , pour tout } x \text{ de } J, f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{x^2-1}{x^2}} .$$

c- Le volume V engendré par rotation autour de l'axe des abscisses de l'arc AB est

$$V = \pi \int_1^2 \frac{x^2-1}{x^2} dx = \pi \int_1^2 \left(1 - \frac{1}{x^2} \right) dx = \pi \left[x + \frac{1}{x} \right]_1^2 = \frac{\pi}{2} .$$