Le sujet comporte 4 page numérotées de 1/4 à 4/4

Exercice 1 : (3 points)

Pour chacune des questions suivantes une seule des trois réponses proposées est exacte.

Indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre correspondant à la réponse choisie.

Aucune justification n'est demandée.

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{4}{x}\right)^{3x-2} =$

a) 1 ; b) e^{12} ; c) $+\infty$

2. La fonction f définie sur $]0, +\infty[$ par $f(x) = 2^{\frac{1}{x}}$ est dérivable sur $]0, +\infty[$ et on a pour tout $x > 0$:

a) $f'(x) = -\frac{1}{x^2} 2^{\frac{1}{x}}$; b) $f'(x) = \frac{\ln 2}{x^2} 2^{\frac{1}{x}}$; c) $f'(x) = -\frac{\ln 2}{x^2} 2^{\frac{1}{x}}$

3. $\int_0^{\frac{1}{\ln 2}} 2^x (1 + 2^x) dx =$

a) $\frac{(e-1)(e+3)}{2 \ln 2}$; b) $-\frac{e}{2 \ln 2}$; c) $e^2 + 2e$

Exercice 2 : (3 points)

1. (X, Y) est une série statistique double. Soit (D) la droite de régression de Y en X et (D') la droite de régression de X en Y. On suppose que $D: y = ax + b$ et $D': x = a'y + b'$.

Soit r le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y.

Etablir $aa' = r^2$.

2. Dans une entreprise, une étude simultanée portant sur deux caractères X et Y donnent les résultats suivants :

- la droite de régression de Y en X a pour équation : $2,4x - y = 0$
- la droite de régression de X en Y a pour équation : $3,5y - 9x + 24 = 0$.

- a) Calculer le coefficient de corrélation linéaire entre X et Y, sachant que leur covariance est positive.
- b) Calculer la moyenne $\bar{X}$ et $\bar{Y}$ de chacun des caractères X et Y.

Exercice 3: (4 points)

L'espace est muni d'un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$.

On donne les points $A(1, -2, 4)$, $B(-2, -6, 5)$ et $C(-4, 0, -3)$.

1. a) Démontrer que les points A , B et C déterminent un plan (P) dont une équation cartésienne est $x - y - z + 1 = 0$.
 b) A tout réel α , on associe le point $M(2\alpha, \alpha, \alpha)$.
 Montrer que $MABC$ est un tétraèdre dont le volume est indépendant de α .
2. a) Ecrire une représentation paramétrique de la droite (Δ) passant par O et orthogonale à (P) .
 b) Déterminer les coordonnées du point O' , projeté orthogonal de O sur (P) .
3. On désigne par H le projeté orthogonal du point O sur la droite (BC) .
 Soit t le réel tel que $\overrightarrow{BH} = t \cdot \overrightarrow{BC}$.
 a) Démontrer que $t = \frac{\overrightarrow{BO} \cdot \overrightarrow{BC}}{BC^2}$.
 b) En déduire le réel t et les coordonnées du point H .
4. Soit (S) la sphère de centre O et tangente en H à la droite (BC) et (S') la sphère de centre O et tangente au plan (P) en O' .

Caractériser l'homothétie h qui transforme (S) en (S') .

Exercice 4: (4 points)

1. Soit n un entier naturel non nul et A, B les entiers naturels définis par :
 $A = 11n + 3$ et $B = 13n - 1$.
 Démontrer que tout diviseur commun de A et B est un diviseur de 50.
2. Soit (E) l'équation $50x - 11y = 1$ où x et y sont deux entiers naturels non nuls.
 Déterminer une solution particulière de (E) .
3. Soit (E') l'équation $50x - 11y = 3$ où x et y sont deux entiers naturels non nuls.
 a) Résoudre l'équation (E') .
 b) En déduire les valeurs de n pour lesquelles $A \wedge B = 50$.
4. Pour quelles valeurs de n , $A \wedge B = 25$?

Exercice 5 : (6 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1. Montrer que pour tout réel x non nul, $\frac{e^x - 1}{x} > 0$.

2. On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par
$$\begin{cases} f(x) = \ln\left(\frac{e^x - 1}{x}\right), & \text{si } x \neq 0 \\ f(0) = 0 \end{cases}$$

a) Montrer que f est continue en 0.

b) Montrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ puis déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

3. On admet que f est dérivable sur $\mathbb{R}$.

a) Montrer que pour tout x réel non nul, $f'(x) = \frac{xe^x - e^x + 1}{x(e^x - 1)}$.

b) Les courbes (C_1) et (C_2) en annexe à la page 4/4 représentent les fonctions g et h définies sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = xe^x$ et $h(x) = e^x - 1$. (C_2) est celle tracée en pointillés.

Identifier la représentations graphique de chacune des fonctions g et h .

Donner graphiquement le signe de $g(x) - h(x)$.

En déduire le signe de $f'(x)$ pour tout x réel non nul 0.

c) Vérifier que, pour tout réel x , $f(x) - x = f(-x)$.

En déduire le signe de $f(x) - x$ pour tout x de $]0, +\infty[$ puis, montrer que $f'(0) = \frac{1}{2}$.

c) Dresser le tableau de variations de f .

4. On considère la suite (u_n) définie par son premier terme $u_0 > 0$ et pour tout entier naturel n ,

$$u_{n+1} = f(u_n).$$

a) Montrer que pour tout entier n , $u_n > 0$.

b) Montrer que la suite (u_n) est décroissante (on utilisera la question 2.c)

c) En déduire que (u_n) converge et préciser sa limite.

d) On pose pour tout entier naturel n , v_n la valeur moyenne de la fonction f sur l'intervalle $[0, u_n]$.

Montrer que pour tout entier n , $0 \leq v_n \leq u_n$. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n$.

Annexe :

Exercice 3 :

$$1. a) \overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -3 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \\ -7 \end{pmatrix} \text{ donc } \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} 26 \\ -26 \\ -26 \end{pmatrix}.$$

$\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \neq \vec{0}$ donc les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires d'où les points A, B et C ne sont pas alignés et par suite A, B et C déterminent un plan (P).

$$\text{Soit } \vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \vec{n} = \frac{1}{26} \overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC} \quad \text{donc } \vec{n} \text{ est un vecteur normal au plan (P).}$$

Il en résulte qu'une équation cartésienne de (P) est $x - y - z + d = 0$, $d \in \mathbb{R}$.

Comme A(1, -2, 4) est un point de (P) alors $1 + 2 - 4 + d = 0$ d'où $d = 1$.

Ainsi, une équation cartésienne de (P) est : $x - y - z + 1 = 0$.

b) Pour tout réel α , $2\alpha - \alpha - \alpha + 1 = 1 \neq 0$ donc $M(2\alpha, \alpha, \alpha) \notin (P)$ donc les points M, A, B et C ne sont coplanaires d'où MABC est un tétraèdre.

$$\overrightarrow{AM} \begin{pmatrix} 2\alpha - 1 \\ \alpha + 2 \\ \alpha - 4 \end{pmatrix} \text{ donc le volume du tétraèdre est :}$$

$$V = \frac{1}{6} |\overrightarrow{AM} \cdot (\overrightarrow{AB} \wedge \overrightarrow{AC})| = \frac{26}{6} |(2\alpha - 1) - (\alpha + 2) - (\alpha - 4)| = \frac{13}{3}.$$

2. a) la droite (Δ) passant par O est orthogonale au plan (P) est la droite passant par O et

de vecteur directeur $\vec{n} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$ donc une représentation paramétrique de cette droite est

$$\begin{cases} x = t \\ y = -t \\ z = -t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

b) Le point O' est le point d'intersection de la droite (Δ) et du plan (P).

D'où il existe un réel t tel que $O'(t, -t, -t)$.

$$O'(t, -t, -t) \in (P) \Leftrightarrow t + t + t + 1 = 0 \Leftrightarrow t = -\frac{1}{3}.$$

$$\text{Ainsi } O' \left(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right).$$

$$3. \text{ a) On a : } t.\overline{BC} = \overline{BH} \text{ donc } t.\overline{BC}^2 = \overline{BH}.\overline{BC} = (\overline{BO} + \overline{OH}).\overline{BC} = \overline{BO}.\overline{BC} + \overline{OH}.\overline{BC}$$

comme $\overline{OH} \perp \overline{BC}$ sont orthogonaux alors

$$t.\overline{BC}^2 = \overline{BO}.\overline{BC} \text{ d'où } t.BC^2 = \overline{BO}.\overline{BC} \text{ ou encore } t = \frac{\overline{BO}.\overline{BC}}{BC^2}.$$

$$\text{b) On a : } \overline{BO} \begin{pmatrix} 2 \\ 6 \\ -5 \end{pmatrix} \text{ et } \overline{BC} \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ -8 \end{pmatrix} \text{ donc } \overline{BO}.\overline{BC} = -4 + 36 + 40 = 72$$

$$\text{Puis } BC^2 = 4 + 36 + 64 = 104.$$

$$\text{Il en résulte que : } t = \frac{72}{104} = \frac{9}{13}.$$

Les coordonnées de H sont données par :

$$\begin{cases} x_H - x_B = t.x_{\overline{BC}} \\ y_H - y_B = t.y_{\overline{BC}} \\ z_H - z_B = t.z_{\overline{BC}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_H = x_B + t.x_{\overline{BC}} \\ y_H = y_B + t.y_{\overline{BC}} \\ z_H = z_B + t.z_{\overline{BC}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_H = -\frac{44}{13} \\ y_H = -\frac{24}{13} \\ z_H = -\frac{7}{13} \end{cases} \text{ ainsi } H \left(-\frac{44}{13}, -\frac{24}{13}, -\frac{7}{13} \right).$$

4. La sphère (S) est de centre O et tangente en H à la droite (BC) donc le rayon de la

$$\text{sphère (S) est } R = OH = \frac{\sqrt{2561}}{13}.$$

La sphère (S') est de centre O et de tangente au plan (P) donc le rayon de (S') est

$$R' = d(O, P) = \frac{1}{\sqrt{3}}.$$

Si h est une homothétie qui transforme (S) en (S') alors le centre de h est O et le rapport k de h vérifie :

$$R' = |k|.R \Leftrightarrow |k| = \frac{R'}{R} \Leftrightarrow |k| = \frac{1}{197\sqrt{39}} \Leftrightarrow k = \frac{1}{197\sqrt{39}} \text{ ou } k = -\frac{1}{197\sqrt{39}}.$$

Exercice 4 :

$$1. 13.A - 11.B = 13(11n + 3) - 11(13n - 1) = 50$$

Donc tout diviseur commun de A et B est un diviseur de 50.

2. On a : $50 \times 2 - 11 \times 9 = 100 - 99 = 1$ donc (2, 9) est une solution particulière de l'équation (E) : $50x - 11y = 1$.

3. a) Le couple (6, 27) est une solution particulière de l'équation (E') : $50x - 11y = 3$.
D'où $50(x - 6) - 11(y - 27) = 0$ ou encore $50(x - 6) = 11(y - 27)$.

Il en résulte :

11 divise $50(x - 6)$ et (11 et 50 sont premiers entre eux) donc 11 divise $(x - 6)$

D'où il existe un entier relatif k tel que $x - 6 = 11k$ ou encore $x = 11k + 6$.

Ainsi : $50 \cdot 11k = 11(y - 27)$ d'où $y - 27 = 50k$ ou encore $y = 50k + 27$.

Supposons que $(x, y) = (11k + 6, 50k + 27)$ où k est un entier relatif :

$$50 \cdot (11k + 6) - 11(50k + 27) = 50 \cdot 11k + 300 - 11 \cdot 50k - 297 = 3$$

Donc $(11k + 6, 50k + 27)$ est solution de (E') .

L'ensemble des solutions de (E') est $\{(11k + 6, 50k + 27), k \in \mathbb{Z}\}$.

c) Si $A \wedge B = 50$ alors 50 divise $11n + 3$ donc il existe un entier naturel p tel que

$$11k + 3 = 50p \text{ ou encore } 50p - 11n = 3.$$

Le couple (p, n) est solution de (E') et $n = 50k + 27$ où k entier naturel.

Si $n = 50k + 27$ où k entier naturel, nous avons alors

$$\begin{cases} A = 11(50k + 27) + 3 \\ B = 13(50k + 27) - 1 \end{cases} \text{ ou encore } \begin{cases} A = 50(11k + 6) \\ B = 50(13k + 7) \end{cases}$$

Ce qui montre que $A \wedge B = 50$

En conclusion : $A \wedge B = 50$ équivaut à $n = 50k + 27$, k entier naturel.

4. Si $A \wedge B = 25$ alors 25 divise $11n + 3$ donc il existe un entier naturel q tel que

$$11n + 3 = 25q \text{ ou encore } 25q - 11n = 3.$$

Une solution particulière de cette équation est $(1, 2)$ et nous pouvons écrire

$n = 25k' + 2$ où k' est un entier naturel.

Nous obtenons alors :

$$\begin{cases} A = 11(25k' + 2) + 3 \\ B = 13(25k' + 2) - 1 \end{cases} \text{ ou encore } \begin{cases} A = 25(11k' + 1) \\ B = 25(13k' + 1) \end{cases} \text{ ce qui montre que :}$$

- Si k' est pair alors $A \wedge B = 25$.

- Si k' est impair alors $A \wedge B = 50$.

En conclusion : $A \wedge B = 25$ équivaut à $n = 50m + 2$, m entier naturel.

Exercice 5 :

1. Dressons le tableau de signe suivant :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x	-	0	+
$e^x - 1$	-	0	+
$\frac{e^x - 1}{x}$	+		+

Ainsi , pour tout x réel non nul, $\frac{e^x - 1}{x} > 0$.

2. a) On sait que $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ donc $\lim_{x \rightarrow 0} \ln \left(\frac{e^x - 1}{x} \right) = \ln 1 = 0$

par suite $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0 = f(0)$ d'où f est continue en 0.

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} \cdot (1 + e^{-x}) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x - 1}{x} = 0^+$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} \ln x = -\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

3. a) Pour tout réel x non nul , $f'(x) = \frac{e^x \cdot x - (e^x - 1)}{\frac{x^2}{e^x - 1}} = \frac{xe^x - e^x + 1}{x(e^x - 1)}$.

b) (C_1) est la courbe représentative de g et (C_2) est celle de h.

(C_1) est au dessus de (C_2) sur $\mathbb{R}^*$ donc pour tout x réel non nul , $g(x) > h(x)$

(C_1) et (C_2) se rencontrent à l'origine du repère d'où $g(0) = h(0)$.

D'où :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g(x) - h(x)$	+	0	+

On remarque que pour tout x réel non nul , $f'(x) = \frac{xe^x - e^x + 1}{x(e^x - 1)} = \frac{g(x) - h(x)}{x(e^x - 1)}$

Et comme $x(e^x - 1) = x^2 \cdot \frac{e^x - 1}{x} > 0$, alors $f'(x) > 0$.

c) Pour tout réel non nul , on a :

$$\begin{aligned} f(-x) &= \ln \left(\frac{e^{-x} - 1}{-x} \right) = \ln \left(\frac{1 - e^x}{-x} \right) = \ln \left(\frac{e^x - 1}{x} \right) = \ln \left(\frac{e^x - 1}{x} \right) - \ln(e^x) \\ &= \ln \left(\frac{e^x - 1}{x} \right) - x = f(x) - x \end{aligned}$$

Comme $f(0) - 0 = 0 = f(-0)$ alors pour tout x réel , $f(x) - x = f(-x)$.

D'où pour tout $x > 0$, $-x < 0$ et comme f est strictement croissante sur $]-\infty, 0[$ alors $f(-x) < f(0)$
ou encore $f(-x) < 0$ d'où pour tout $x > 0$, $f(x) - x < 0$.

Comme f est dérivable sur $\mathbb{R}$ alors pour tout x réel, $f'(x) - 1 = -f'(-x)$.

Il en résulte : $f'(0) - 1 = -f'(0) \Leftrightarrow 2f'(0) = 1 \Leftrightarrow f'(0) = \frac{1}{2}$.

d) Le tableau de variations de f est :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+	$\frac{1}{2}$	+
$f(x)$	$-\infty$	0	$+\infty$

4. a) On a : $u_0 > 0$.

On suppose que, $u_n > 0$ où n est un entier naturel, et on montre que $u_{n+1} > 0$.

Comme f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ alors $u_n > 0 \Rightarrow f(u_n) > f(0) \Rightarrow u_{n+1} > 0$.

Ainsi : pour tout entier n , $u_n > 0$.

b) Pour tout entier n , $u_n > 0$ donc $f(u_n) - u_n < 0 \Leftrightarrow u_{n+1} - u_n < 0 \Leftrightarrow u_{n+1} < u_n$.

Donc la suite (u_n) est décroissante.

c) La suite (u_n) est décroissante et comme la suite (u_n) est minorée par 0 alors (u_n) converge.

Soit $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$, $u_n > 0 \Rightarrow \ell \geq 0$

D'autre part f est continue sur $\mathbb{R}$ et $u_{n+1} = f(u_n)$ alors $\ell = f(\ell)$

$f(-\ell) = f(\ell) - \ell = 0$ donc $-\ell = 0 \Leftrightarrow \ell = 0$. Par suite : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

d) Pour tout n , $v_n = \frac{1}{u_n} \int_0^{u_n} f(x) dx$.

$0 \leq x \leq u_n \Rightarrow 0 \leq f(x) \leq f(u_n) \Rightarrow 0 \leq f(x) \leq u_{n+1}$. Or $u_{n+1} < u_n$, il en résulte :

$$0 \leq \int_0^{u_n} f(x) dx \leq u_n \int_0^{u_n} 1 dx = u_n^2 \quad \text{donc} \quad 0 \leq \frac{1}{u_n} \int_0^{u_n} f(x) dx \leq u_n \quad \text{3}$$

On a, pour tout entier n , $0 \leq v_n \leq u_n$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.