Mathématiques		<i>Devoir de synthèse n°1</i>	
Lycée IBN KHALDOUN - RADES			
4 ^e Maths 1	Mardi 06-12-2011	Durée : 3 heures	Prof : ABIDI Farid

Exercice n°1: (3pts)

Répondre par Vrai à Faux et avec justification à chacune des trois propositions suivantes.

1) Soit $f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{x}\right)$ alors, pour tout $x > 0$, $f'(x) = -\frac{\pi}{x^2} \cos\left(\frac{\pi}{x}\right)$.

2) Si (v_n) est une suite décroissante et convergente vers 0, alors les suites (v_n) et $(-v_n)$ sont adjacentes.

3) Soit θ un réel de l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, l'écriture exponentielle de $\frac{i}{1+i \tan \theta}$ est $\cos \theta e^{i\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)}$.

Exercice n°2: (5 points)

Dans le plan orienté, soit un rectangle ABCD tel que $AB=2AD$ et $(\overline{AB}, \overline{AD}) \equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]$. On note I et J les milieux respectifs des segments [AB] et [CD] et K le symétrique de I par rapport à (DC).

1) Montrer que le quadrilatère ICKD est un carré.

2) On pose $f = S_{(IC)} \circ t_{\overline{AB}} \circ S_{(IJ)}$.

a) Caractériser l'application $S_{(BC)} \circ S_{(IJ)}$.

b) En déduire que f est une rotation dont on précisera l'angle et le centre.

3) On pose $g = t_{\overline{IK}} \circ S_{(IC)}$.

Montrer que g est la symétrie glissante d'axe (AJ) et de vecteur $\overline{IC}$.

4) Pour tout point M du plan, on pose $M' = R_{\left(D, \frac{\pi}{2}\right)}(M)$ et $M'' = g(M)$.

Montrer que M' et M'' sont symétriques par rapport à la droite (IK).

Exercice n°3: (6 points)

Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

Soit l'équation (E) : $z^3 - 3z^2 - 2ia^2z + 6ia^2 = 0$ où a est nombre complexe non nul.

1) a- Vérifier 3 est une racine de (E).

b- Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation (E).

2) On désigne par I, A, M' et M'' les points d'affixes 1, 3, $(1+i)a$ et $-(1+i)a$.

On pose $a = x + iy$ avec x et y sont deux réel non nuls à la fois.

a- Montrer que : (A, M' et M'' sont alignés) si, et seulement si, $(a = \alpha(1-i), \text{ où } \alpha \in \mathbb{R}^*)$.

b- Montrer que : ($\overline{AM'}$ et $\overline{AM''}$ sont orthogonaux) si, et seulement si, $(|a| = \frac{3}{\sqrt{2}})$.

Dans toute la suite de l'exercice, on prend $a = \frac{\sqrt{3}}{2}(1+i)$.

- 3) Montrer que le triangle $AM'M''$ est équilatéral, de sens direct et de centre I.
- 4) Soit R la rotation de centre I qui transforme A en M' et R' la rotation de centre A qui transforme M' en M''.
 - a- Donner les écritures complexes de R et R'.
 - b- En déduire l'écriture complexe de $f = R \circ R'$. Caractériser f.

Exercice n°4: (6 points)

Soit f une fonction définie et deux fois dérivables sur $\mathbb{R}$. On donne la courbe représentative (C) de la fonction dérivée f' de f. (C) passe par les points A(0,1) et B(1, $\frac{1}{2}$). L'axe des abscisses est une asymptote à (C).

On suppose que $f(1) > 1$ et que la courbe représentative (Γ) de f admet une asymptote horizontale au voisinage de $+\infty$.

- 1) Par lecture graphique, répondre aux questions suivantes:
 - a) Déterminer le sens de variation de f.
 - b) (Γ) admet-elle un point d'inflexion? Justifier votre réponse.
 - c) Déterminer $f'([1, +\infty[)$ et en déduire que $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$ pour tout $x \geq 1$.
- 2) Montrer que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique α dans $[1, +\infty[$.
- 3) Montrer que pour tout $x \geq 1$, $|f(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2}|x - \alpha|$.

- 3) Soit (u_n) la suite réelle définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = f(u_n)$, pour tout entier naturel n.
 - a) Montrer que pour tout entier naturel n, on a : $u_n \geq 1$.
 - b) Montrer que pour tout entier naturel n, on a : $|u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha|$.
 - c) En déduire que pour tout entier naturel n, on a : $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n (\alpha - 1)$.
 et calculer la limite de la suite (u_n) .

CorrigéExercice n°1:1) **Faux.**

En effet : Si $f(x) = \cos\left(\frac{\pi}{x}\right)$ alors, pour tout $x > 0$,

$$f'(x) = -\frac{\pi}{x^2} \cos'\left(\frac{\pi}{x}\right) = -\frac{\pi}{x^2} \left[-\sin\left(\frac{\pi}{x}\right)\right] = \frac{\pi}{x^2} \sin\left(\frac{\pi}{x}\right).$$

2) **Vrai.**

En effet : Si (v_n) est une suite décroissante et converge vers 0 alors, $(-v_n)$ est croissante et converge vers 0. D'où pour tout entier n , $(v_n) > (-v_n)$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} (v_n) - (-v_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} 2v_n = 0$.

Ainsi, les suites (v_n) et $(-v_n)$ sont adjacentes.

3) **Vrai.**

En effet :

Soit θ un réel de l'intervalle $\left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, on a

$$\cos \theta > 0 \quad \frac{i}{1+i \tan \theta} = \frac{i}{1+i \frac{\sin \theta}{\cos \theta}} = \cos \theta \frac{e^{i\frac{\pi}{2}}}{\cos \theta + i \sin \theta} = \cos \theta \frac{e^{i\frac{\pi}{2}}}{e^{i\theta}} = \cos \theta e^{i\left(\frac{\pi}{2}-\theta\right)}.$$

Exercice n°2:

1) ABCD est un rectangle, I milieu de [AB] et J milieu de [CD] donc AIJD et IBCJ sont deux carrés isométriques et adjacents d'où $IC = ID$ et

$$\begin{aligned}(\overrightarrow{IC}, \overrightarrow{ID}) &\equiv (\overrightarrow{IC}, \overrightarrow{IJ}) + (\overrightarrow{IJ}, \overrightarrow{ID}) [2\pi] \\ &\equiv \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4} [2\pi] \\ &\equiv \frac{\pi}{2} [2\pi]\end{aligned}$$

donc le triangle ICD est isocèle et rectangle en I.

Comme J est le symétrique de I par rapport à (CD) alors le quadrilatère ICKD est un carré.

2) Soit $f = S_{(IC)} \circ t_{\overline{AB}} \circ S_{(IJ)}$.

a) On a : $t_{\overline{IB}}((IJ)) = (BC)$ donc $S_{(BC)} \circ S_{(IJ)} = t_{2\overline{IB}} = t_{\overline{AB}}$.

b) $f = S_{(IC)} \circ t_{\overline{AB}} \circ S_{(IJ)} = S_{(IC)} \circ S_{(BC)} \circ S_{(IJ)} \circ S_{(IJ)} = S_{(IC)} \circ S_{(BC)} = R_{(B, 2(\overline{CB}, \overline{CI}))} = R_{(B, \frac{\pi}{2})}$.

3) On pose $g = t_{\overline{IK}} \circ S_{(IC)}$.

$g = t_{\overline{IK}} \circ S_{(IC)} = t_{\overline{IC+ID}} \circ S_{(IC)} = t_{\overline{IC}} \circ t_{\overline{ID}} \circ S_{(IC)} = t_{\overline{IC}} \circ S_{(AJ)} \circ S_{(IC)} \circ S_{(IC)} = t_{\overline{IC}} \circ S_{(AJ)}$. Ainsi, g est la symétrie glissante d'axe (AJ) et de vecteur $\overline{IC}$.

4) Pour tout point M du plan, on pose $M' = t_{\overline{AB}}(M)$ et $M'' = g(M)$.

$M' = f(M) \Leftrightarrow M = f^{-1}(M')$ donc $M'' = g(M) = g[f^{-1}(M')] = (g \circ f^{-1})(M')$

$g \circ f^{-1} = t_{\overline{IC}} \circ S_{(AJ)} \circ (t_{\overline{AB}})^{-1} = S_{(AJ)} \circ t_{\overline{IC}} \circ t_{\overline{BA}} = S_{(AJ)} \circ t_{\overline{IC+BA}} = S_{(AJ)} \circ t_{\overline{BJ}} = S_{(AJ)} \circ S_{(AJ)} \circ S_{(IC)} = S_{(IC)}$

Car $t_{\frac{1}{2}\overline{BJ}}((IC)) = t_{\frac{1}{2}\overline{ID}}((IC)) = (AJ)$ donc $S_{(IC)} \circ S_{(AJ)} = t_{\overline{BJ}}$

Ainsi, M' et M'' sont symétriques par rapport à la droite (IC).

Exercice n°3:

Soit l'équation (E) : $z^3 - 3z^2 - 2ia^2z + 6ia^2 = 0$ où a est nombre complexe non nul.

1) a- $3^3 - 3 \cdot 3^2 - 2ia^2 \cdot 3 + 6ia^2 = 27 - 27 - 6ia^2 + 6ia^2 = 0$ donc 3 est une racine de (E).

b- Pour tout z de $\mathbb{C}$, $z^3 - 3z^2 - 2ia^2z + 6ia^2 = (z - 3)(z^2 + bz + c)$
 $= z^3 + (b - 3)z^2 + (c - 3b)z - 3c$

D'où par identification :
$$\begin{cases} b - 3 = -3 \\ c - 3b = -2ia^2 \\ -3c = 6ia^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ c = -2ia^2 \end{cases}$$

Par suite, (E) $\Leftrightarrow (z - 3)(z^2 - 2ia^2) = 0 \Leftrightarrow z = 3$ ou $z^2 = 2ia^2$

Or $2ia^2 = (1+i)^2 a^2 = [(1+i)a]^2$, alors les solutions de l'équation (E) sont : 3, $(1+i)a$ et $-(1+i)a$.

3) On désigne par I, A, M' et M'' les points d'affixes 1, 3, $(1+i)a$ et $-(1+i)a$.

On pose $a = x + iy$ avec x et y sont deux réel non nuls à la fois.

On a : $(1+i)a = (1+i)(x+iy) = x-y + i(x+y)$ donc $\overline{AM'} = \begin{pmatrix} x-y-3 \\ x+y \end{pmatrix}$ et $\overline{AM''} = \begin{pmatrix} -x+y-3 \\ -x-y \end{pmatrix}$

a- A, M' et M'' sont alignés $\Leftrightarrow \overline{AM'}$ et $\overline{AM''}$ sont colinéaires.

$$\Leftrightarrow \det(\overline{AM'}, \overline{AM''}) = 0 \Leftrightarrow (x-y-3) \cdot (-x-y) - (x+y) \cdot (-x+y-3) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x+y)(-x+y+3+x-y+3) = 0 \Leftrightarrow 6(x+y) = 0 \Leftrightarrow y = -x \Leftrightarrow a = x(1-i)$$

Ainsi : A, M' et M'' sont alignés si, et seulement si, ($a = \alpha(1-i)$, où $\alpha \in \mathbb{R}^*$).

$$\text{b- } (\overline{AM'} \text{ et } \overline{AM''} \text{ sont orthogonaux}) \Leftrightarrow \overline{AM'} \cdot \overline{AM''} = 0 \Leftrightarrow (x-y-3)(-x+y-3) + (x+y)(-x-y) = 0$$

$$\Leftrightarrow -((x-y)-3)((x-y)+3) - (x+y)^2 = 0 \Leftrightarrow -(x-y)^2 + 9 - (x+y)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow -2x^2 - 2y^2 + 9 = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = \frac{9}{2} \Leftrightarrow x^2 + y^2 = \frac{3}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow |a| = \frac{3}{\sqrt{2}}$$

$$3) \text{ si } a = \frac{\sqrt{3}}{2}(1+i) \text{ alors } (1+i)a = (1+i)^2 \frac{\sqrt{3}}{2} = i\sqrt{3}.$$

$$AM' = |i\sqrt{3} - 3| = \sqrt{12} = 2\sqrt{3} \text{ et } AM'' = |-i\sqrt{3} - 3| = \sqrt{12} = 2\sqrt{3}$$

$z_{\overline{IA}} + z_{\overline{IM'}} + z_{\overline{IM''}} = (3-1) + (i\sqrt{3}-1) + (-i\sqrt{3}-1) = 0$ donc $\overline{IA} + \overline{IM'} + \overline{IM''} = \vec{0}$ donc I est le centre de gravité du triangle AM'M''.

$$\begin{aligned} \arg(\overline{AM'}, \overline{AM''}) &\equiv \arg\left(\frac{-i\sqrt{3}-3}{i\sqrt{3}-3}\right)[2\pi] \equiv \arg\left(\frac{3+i\sqrt{3}}{3-i\sqrt{3}}\right)[2\pi] \equiv \arg\left(\frac{\sqrt{3}+i}{\sqrt{3}-i}\right)[2\pi] \equiv \arg\left(\frac{(\sqrt{3}+i)^2}{4}\right)[2\pi] \\ &\equiv 2\arg\left(\frac{\sqrt{3}+i}{2}\right)[2\pi] \equiv 2 \cdot \frac{\pi}{6}[2\pi] \equiv \frac{\pi}{3}[2\pi] \end{aligned}$$

Donc le triangle AM'M'' équilatéral et de sens direct.

4) Soit R la rotation de centre I qui transforme A en M' et R' la rotation de centre A qui transforme M' en M''.

a- R est la rotation de centre I(1) et d'angle $\frac{2\pi}{3}$ donc l'écriture complexe de la rotation R est :

$$z'-1 = e^{i\frac{2\pi}{3}}(z-1) \Leftrightarrow z' = e^{i\frac{2\pi}{3}}(z-1) + 1 \Leftrightarrow z' = e^{i\frac{2\pi}{3}}z + 1 - e^{i\frac{2\pi}{3}} \Leftrightarrow z' = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}z + \frac{3-i\sqrt{3}}{2}$$

R' est la rotation de centre A(3) et d'angle $\frac{2\pi}{3}$ donc l'écriture complexe de la rotation R' est :

$$z'-3 = e^{i\frac{\pi}{3}}(z-3) \Leftrightarrow z' = e^{i\frac{\pi}{3}}(z-3) + 3 \Leftrightarrow z' = e^{i\frac{\pi}{3}}z + 3 - 3e^{i\frac{\pi}{3}} \Leftrightarrow z' = \frac{1+i\sqrt{3}}{2}z + \frac{3-3i\sqrt{3}}{2}$$

b- L'écriture complexe de $f = R \circ R'$ est : $z' = \frac{1+i\sqrt{3}}{2}z + \frac{3-3i\sqrt{3}}{2}$

$$z'' = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2}z' + \frac{3-i\sqrt{3}}{2} \quad \text{avec} \quad z' = \frac{1+i\sqrt{3}}{2}z + \frac{3-3i\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{D'où } z'' = \frac{-1+i\sqrt{3}}{2} \left(\frac{1+i\sqrt{3}}{2}z + \frac{3-3i\sqrt{3}}{2} \right) + \frac{3-i\sqrt{3}}{2} = -z + \left(\frac{3-i\sqrt{3}}{2} \right) \left(\frac{1+i\sqrt{3}}{2} \right) = -z + \frac{3+i\sqrt{3}}{2}$$

Ainsi, f est la symétrie centrale de centre $J \left(\frac{3}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$.

Exercice n°4:

1) a) Pour tout x réel, $f'(x) > 0$ donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

b) La fonction f' admet un maximum en 0 donc la dérivée seconde f'' de f' s'annule en 0 en changeant de signe d'où la courbe (Γ) de f' admet un point d'inflexion d'abscisse 0.

$$\text{c) } f'([1, +\infty[) = \left] \lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x), f'(1) \right] = \left] 0, \frac{1}{2} \right].$$

On en déduit que pour tout $x \geq 1$, $0 < f'(x) \leq \frac{1}{2}$ donc $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$.

2) Soit pour tout $x \geq 1$, $g(x) = f(x) - x$.

g est continue et dérivable sur $[1, +\infty[$. Pour tout $x \geq 1$, $g'(x) = f'(x) - 1 < 0$ donc g est strictement décroissante sur $[1, +\infty[$.

$$g([1, +\infty[) =]\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x), g(1)] =]\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x, f(1) - 1]$$

On a :

- ✓ d'une part : $f(1) > 1$ alors $f(1) - 1 > 0$.
- ✓ et d'autre part : la courbe (Γ) de f admet une asymptote horizontale au voisinage de $+\infty$ donc la limite de f en $+\infty$ est finie d'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) - x = -\infty$.

Il en résulte : $g([1, +\infty[) =]-\infty, f(1) - 1]$ et $0 \in g([1, +\infty[)$.

Ainsi, l'équation $g(x) = 0$ admet une unique solution α dans $[1, +\infty[$.

3) f est dérivable sur $[1, +\infty[$ et pour tout x de $[1, +\infty[$, $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}$.

Donc pour tout $x \geq 1$, $|f(x) - f(\alpha)| \leq \frac{1}{2}|x - \alpha| \Leftrightarrow |f(x) - \alpha| \leq \frac{1}{2}|x - \alpha|$.

3) Soit (u_n) la suite réelle définie sur $\mathbb{N}$ par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = f(u_n)$, pour tout entier naturel n .

a) On a : $u_0 = 1$ donc $u_0 \geq 1$.

On suppose que : $u_n \geq 1$, pour un certain rang n , et on démontre que $u_{n+1} \geq 1$.

Comme f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ alors : $u_n \geq 1 \Rightarrow f(u_n) \geq f(1) \Rightarrow u_{n+1} \geq 1$.

Donc pour tout entier naturel n , $u_n \geq 1$.

b) Pour tout entier naturel n , $u_n \geq 1$ donc $|f(u_n) - \alpha| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha| \Leftrightarrow |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha|$.

c) On a : $|u_0 - \alpha| = |1 - \alpha| = \alpha - 1$ donc $|u_0 - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^0 \cdot (\alpha - 1)$.

On suppose que : $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n (\alpha - 1)$, pour un certain rang n , et mon montre que :

$$|u_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} (\alpha - 1).$$

$$|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n (\alpha - 1) \Rightarrow \frac{1}{2}|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} (\alpha - 1).$$

$$\text{Or } |u_{n+1} - \alpha| \leq \frac{1}{2}|u_n - \alpha|, \text{ donc } |u_{n+1} - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} (\alpha - 1).$$

On conclue : pour tout entier naturel n , on a : $|u_n - \alpha| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n (\alpha - 1)$.

Comme $-1 < \frac{1}{2} < 1$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n (1 - \alpha) = 0$. Il en résulte : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.