Problèmes de révision

Problème 1 :

L'objet du problème est d'étudier sur l'intervalle $]0, +\infty[$ la fonction f définie par

$$f(x) = x\sqrt{e^{\frac{2}{x}} - 1}.$$

1. Soit g la fonction définie sur $[0, +\infty[$ par $g(t) = 1 - t - e^{-2t}$.

a) Etudier les variations de g .

b) Démontrer qu'il existe un unique réel a strictement positif tel que $g(a) = 0$ et vérifier $0,79 < a < 0,80$.

c) Etudier le signe de $g(t)$ suivant les valeurs de t .

2. a) Montrer que pour tout $x > 0$, $\ln(f(x)) = \frac{1}{x}(1 + x \ln x) + \frac{1}{2} \ln\left(1 - e^{-\frac{2}{x}}\right)$.

b) En déduire $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$.

3. a) Montrer que pour tout u de $[0, 1]$, $0 \leq e^u - 1 \leq eu$.

b) En déduire à l'aide d'une intégration que, pour tout u de $[0, 1]$:

$$1 + u \leq e^u \leq 1 + u + \frac{e}{2}u^2.$$

c) Utiliser cet encadrement pour démontrer que pour tout x de $[2, +\infty[$,

$$2x \leq [f(x)]^2 \leq 2x + 2e.$$

d) En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

4. a) Montrer que f est dérivable sur $]0, +\infty[$ et que pour tout $x > 0$,

$$f'(x) = \frac{e^{\frac{2}{x}}}{\sqrt{e^{\frac{2}{x}} - 1}} g\left(\frac{1}{x}\right).$$

b) Dresser le tableau de variations de f .

c) Tracer la courbe représentative (C) de f dans un repère orthonormé.

Problème 2:

Soit f_n la fonction définie sur $[-1, +\infty[$ par $f_n(x) = \frac{e^x}{(1+x)^n}$ où $n \in \mathbb{N}^*$.

On note (C_n) sa courbe dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$; unité graphique 2cm.

A-1. a) Etudier les variations de f_1 et f_2 .

b) Etudier la position relative de (C_1) et (C_2) .

Problèmes de révision

Construire (C_1) et (C_2) dans le même repère.

c) Calculer, en cm^2 , l'aire de la partie du plan limitée par (C_1) et (C_2)

et les droites d'équations : $x = 0$ et $x = 1$.

2. Soit u_n la valeur minimale de f_n sur $[-1, +\infty[$.

a) Montrer que : $u_n = f_n(n-1)$.

b) Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(u_n)$. En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

B- Pour tout $x > \frac{1}{e}$, on pose $F(x) = \int_0^{\ln x} f_2(t) dt$.

1. Justifier l'existence de $F(x)$ pour x de $\left] \frac{1}{e}, +\infty \right[$.

2. Montrer que pour tout $x > \frac{1}{e}$, on a : $F(x) \leq x \left(1 - \frac{1}{\ln x + 1} \right)$.

En déduire $\lim_{x \rightarrow \left(\frac{1}{e}\right)^+} F(x)$.

3. a) Montrer que pour tout $x > \frac{1}{e}$, on a :

$$F(x) = \frac{x}{(\ln x + 1)^2} - 1 + 2 \int_0^{\ln x} f_3(t) dt$$

b) En déduire que pour tout $x \geq 1$, on a : $F(x) \geq \frac{x}{(\ln x + 1)^2} - 1$.

En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x)$

4. Montrer que la fonction F est une bijection de $\left] \frac{1}{e}, +\infty \right[$ sur $\mathbb{R}$.

C- Pour $n \geq 1$, on pose $I_n = \int_0^1 f_n(x) dx$.

1. Montrer que la suite (I_n) est décroissante et qu'elle est convergente.

Problèmes de révision

2. a) Montrer que pour tout $n > 2$, on a : $\frac{1}{n-1} \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}} \right) \leq I_n \leq \frac{e}{n-1} \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}} \right)$.

b) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$.

3. a) Exprimer $f'_n(x)$ à l'aide de $f_n(x)$ et $f_{n+1}(x)$.

b) En déduire une relation entre I_n et I_{n+1} et montrer que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} n I_{n+1} = 1$

Problème 3 :

A tout entier naturel $n \geq 1$ on associe la fonction numérique f_n définie sur

l'intervalle $I = [1 ; +\infty[$ par : $f_n(x) = \frac{1}{n!} \frac{(\ln x)^n}{x^2}$

On note C_n la courbe représentative de f_n dans un repère orthogonal $(O ; \vec{i}, \vec{j})$ du plan. (Choisir comme unités graphiques 1 cm sur $(x'x)$ et 10 cm sur $(y'y)$).

Partie A

1. Déterminer la limite de f_1 en $+\infty$. Etudier les variations de f_1 .
2. Tracer la tangente à C_1 au point d'abscisse 1 puis tracer la courbe C_1 .
3. A l'aide d'une intégration par parties, calculer, pour x élément de I :

$$I_1(x) = \int_1^x f_1(t) dt$$

Partie B

1° Déterminer la limite de f_n en $+\infty$.

2° a) Calculer $f'_n(x)$ et vérifier que $f'_n \left(e^{\frac{n}{2}} \right) = 0$.

Dresser le tableau de variation de f_n .

b) Vérifier que la valeur maximale de f_n sur I est : $y_n = \frac{1}{n!} \left(\frac{n}{2e} \right)^n$.

3° a) Soit $x \geq 1$. Etudier, suivant les valeurs de x , le signe de $f_2(x) - f_1(x)$.

b) Déterminer la tangente à C_2 au point d'abscisse 1.

Préciser les positions relatives de C_1 et C_2 . Tracer C_2 dans $(O ; \vec{i}, \vec{j})$.

Problèmes de révision

4° On se propose d'étudier la suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$. Soit n un entier strictement positif.

a) Calculer, pour $x > 1$, $\frac{f_{n+1}(x)}{f_n(x)}$.

b) Montrer que $y_{n+1} = \frac{1}{2} f_n \left(e^{\frac{n+1}{2}} \right)$ et que $y_{n+1} \leq \frac{1}{2} y_n$

c) En déduire que $y_n \leq \frac{1}{e} \frac{1}{2^n}$. Quelle est la limite de la suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$?

Partie C

A tout entier $n \geq 1$ et à tout nombre réel x de I , on associe l'intégrale : $I_n(x) = \int_1^x f_n(t) dt$.

1° a) Soit $k \geq 1$ un entier. Grâce à une intégration par parties démontrer la relation :

$$I_{k+1}(x) = I_k(x) - \frac{1}{(k+1)!} \frac{(\ln x)^{k+1}}{x}$$

b) En déduire que pour tout entier $n \geq 1$

$$I_n(x) = 1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} - \frac{(\ln x)^2}{2!x} - \dots - \frac{(\ln x)^{n-1}}{(n-1)!x} - \frac{(\ln x)^n}{n!x}.$$

2° Soit $\alpha \geq 1$ un nombre réel fixé.

a) Montrer que $0 \leq I_n(\alpha) \leq (\alpha - 1) y_n$, (y_n a été défini dans B.2° b))

b) En déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n(\alpha)$. (On utilisera B.4° c))

3° Pour $n \geq 1$ et $x \geq 1$ on pose : $W_n(x) = 1 + \frac{\ln x}{1!} + \frac{(\ln x)^2}{2!} + \dots + \frac{(\ln x)^n}{n!}$

a) Exprimer $W_n(x)$ en fonction de $I_n(x)$.

b) $\alpha \geq 1$ étant un nombre réel fixé, déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} W_n(\alpha)$.

c) En déduire la limite γ de la suite $(U_n)_{n \geq 1}$ de terme général :

$$U_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}.$$

En s'aidant de la calculatrice, donner une valeur décimale approchée de U_6 à 10^{-4} près.

Comparer cette valeur à γ .

Problèmes de révision

Corrigé

Problème 1 :

1. a) On a : $\lim_{t \rightarrow +\infty} 1-t = -\infty$ et $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-t} = 0$ donc $\lim_{t \rightarrow +\infty} g(t) = \lim_{t \rightarrow +\infty} 1-t - e^{-2t} = +\infty$.

g est dérivable sur $[0, +\infty[$ comme somme de deux fonctions dérivables et l'on a pour tout t de $[0, +\infty[$, $g'(t) = -1 + 2e^{-2t}$.

$$\text{On a : } g'(t) = 0 \Leftrightarrow -1 + 2e^{-2t} = 0 \Leftrightarrow e^{-2t} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow t = \ln\sqrt{2} \Leftrightarrow t = \frac{\ln 2}{2},$$

$$g'(t) > 0 \Leftrightarrow -1 + 2e^{-2t} > 0 \Leftrightarrow e^{-2t} < \frac{1}{2} \Leftrightarrow t < \ln\sqrt{2} \Leftrightarrow t < \frac{\ln 2}{2},$$

$$\text{et } g\left(\frac{\ln 2}{2}\right) = 1 - \frac{\ln 2}{2} - e^{-\ln 2} = \frac{1 - \ln 2}{2}.$$

Ainsi le tableau de variation de g est :

t	0	$\frac{\ln 2}{2}$	$+\infty$
$g'(t)$	+	0	-
$g(t)$	0	$\frac{1 - \ln 2}{2}$	$-\infty$

b) g est continue et strictement croissante sur $\left]0, \frac{\ln 2}{2}\right]$ et $g(0) = 0$ donc :

$$t > 0 \Rightarrow g(t) > g(0) \Rightarrow g(t) > 0.$$

g est continue et strictement décroissante sur $\left[\frac{\ln 2}{2}, +\infty\right[$,

$$g\left(\left[\frac{\ln 2}{2}, +\infty\right]\right) = \left]-\infty, \frac{1 - \ln 2}{2}\right] \text{ et } 0 \in \left]-\infty, \frac{1 - \ln 2}{2}\right]$$

Donc il existe un seul réel $a > 0$ tel que $g(a) = 0$.

$$g(0,79) \approx 0,006 \text{ et } g(0,80) \approx -0,001 \text{ donc } g(0,80) < g(a) < g(0,79)$$

Et comme g est strictement décroissante sur $\left[\frac{\ln 2}{2}, +\infty\right[$, il en résulte que :

$$0,79 < a < 0,80.$$

d) On en déduit que :

✓ Pour tout t de $\left]0, \frac{\ln 2}{2}\right]$, $g(t) > 0$

✓ Pour tout t de $\left[\frac{\ln 2}{2}, a\right]$, $g(t) \geq g(a)$ donc $g(t) \geq 0$

✓ Pour tout t $[a, +\infty[$, $g(t) \leq g(a)$ donc $g(t) \leq 0$.

D'où

Problèmes de révision

x	0	a	$+\infty$
g(x)	0	+	-

2. a) Pour tout $x > 0$, $f(x) = x\sqrt{e^{\frac{2}{x}} - 1} > 0$ donc on peut écrire :

$$\ln[f(x)] = \ln\left(x\sqrt{e^{\frac{2}{x}} - 1}\right) = \ln x + \ln\left(\sqrt{e^{\frac{2}{x}} - 1}\right) = \ln x + \frac{1}{2}\ln\left(e^{\frac{2}{x}} - 1\right).$$

$$\begin{aligned} \text{Or } e^{\frac{2}{x}} - 1 &= e^{\frac{2}{x}}\left(1 - e^{-\frac{2}{x}}\right) \text{ donc } \ln(f(x)) = \ln x + \frac{1}{2}\left[\ln\left(e^{\frac{2}{x}}\right) + \ln\left(1 - e^{-\frac{2}{x}}\right)\right] \\ &= \ln x + \frac{1}{x} + \frac{1}{2}\ln\left(1 - e^{-\frac{2}{x}}\right) \\ &= \frac{1}{x}(1 + x\ln x) + \frac{1}{2}\ln\left(1 - e^{-\frac{2}{x}}\right) \end{aligned}$$

b) On sait que $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x}(1 + x \ln x) = +\infty$.

Et $\lim_{x \rightarrow 0^+} -\frac{2}{x} = -\infty$ donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{-\frac{2}{x}} = 0$ d'où $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln\left(1 - e^{-\frac{2}{x}}\right) = \ln 1 = 0$.

Par suite, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(f(x)) = +\infty$.

Or $f(x) = e^{\ln(f(x))}$ donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\ln(f(x))} = +\infty$. On en déduit que $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$.

3. a) $0 \leq x \leq 1 \Leftrightarrow 1 \leq e^x \leq e$ donc pour tout t de $[0, 1]$ et pour tout x de $[0, t]$, on peut écrire : $\int_0^t dx \leq \int_0^t e^x dx \leq \int_0^t e dx \Leftrightarrow t \leq e^t - 1 \leq et$.

D'où pour tout t de $[0, 1]$, $0 \leq e^t - 1 \leq et$

NB :

Pour tout t positif, $e^t - 1 \geq 0$.

Posons $h(t) = e^t - 1 - et$, où $t \in [0, 1]$:

h est dérivable sur $[0, 1]$ et on a $h'(t) = e^t - e$.

Comme $t \leq 1$ alors $e^t \leq e$ donc $h'(t) \leq 0$ d'où h est décroissante sur $[0, 1]$.

Par suite : $0 \leq t \leq 1 \Rightarrow h(1) \leq h(t) \leq h(0)$ d'où $e^t - 1 - et \leq 0 \Rightarrow e^t - t \leq et$.

On résume : pour tout t de $[0, 1]$, $0 \leq e^t - 1 \leq et$.

b) Pour tout u de $[0, 1]$ et pour tout t de $[0, u]$, on peut écrire :

$$\begin{aligned} 0 \leq \int_0^u (e^t - 1) dt &\leq \int_0^u et dt \Leftrightarrow 0 \leq [e^t - t]_0^u \leq e \left[\frac{t^2}{2} \right]_0^u \\ &\Leftrightarrow 0 \leq e^u - u - 1 \leq e \frac{u^2}{2} \Leftrightarrow 1 + u \leq e^u \leq 1 + u + e \frac{u^2}{2} \end{aligned}$$

Problèmes de révision

c) Pour tout $x \geq 2$, $[f(x)]^2 - 2x = x^2 \left(e^{\frac{2}{x}} - 1 \right) - 2x$.

Or $x \geq 2 \Rightarrow \frac{2}{x} \leq 1$, on peut donc poser $u = \frac{2}{x}$ et utiliser les inégalités

$$1 + u \leq e^u \leq 1 + u + e \frac{u^2}{2} \text{ qui donnent } 1 + \frac{2}{x} \leq e^{\frac{2}{x}} \leq 1 + \frac{2}{x} + e \frac{2}{x^2}.$$

En multipliant par x^2 , on obtient : $x^2 + 2x \leq x^2 e^{\frac{2}{x}} \leq x^2 + 2x + 2e$

$$\text{D'où } 2x \leq x^2 e^{\frac{2}{x}} - x^2 \leq 2x + 2e \Leftrightarrow 2x \leq x^2 \left(e^{\frac{2}{x}} - 1 \right) \leq 2x + 2e$$

C'est-à-dire : $2x \leq [f(x)]^2 \leq 2x + 2e$.

d) On a : pour tout $x \geq 2$, $2x \leq [f(x)]^2 \leq 2x + 2e$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x = +\infty$

$$\text{donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x)]^2 = +\infty \text{ d'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

4. a) Pour tout $x > 0$, $\frac{2}{x} > 0$ donc $e^{\frac{2}{x}} > 1$ ou encore $e^{\frac{2}{x}} - 1 > 0$.

Ainsi, la fonction $x \mapsto e^{\frac{2}{x}} - 1$ est dérivable et strictement positive sur $]0, +\infty[$

donc $x \mapsto \sqrt{e^{\frac{2}{x}} - 1}$ est dérivable sur $]0, +\infty[$.

Comme la fonction $x \mapsto x$ est dérivable sur $]0, +\infty[$, alors f est dérivable sur $]0, +\infty[$.

$$\begin{aligned} \text{Pour tout } x > 0, f'(x) &= \sqrt{e^{\frac{2}{x}} - 1} + x \frac{-\frac{2}{x^2} e^{\frac{2}{x}}}{2\sqrt{e^{\frac{2}{x}} - 1}} = \sqrt{e^{\frac{2}{x}} - 1} - \frac{1}{x\sqrt{e^{\frac{2}{x}} - 1}} e^{\frac{2}{x}} \\ &= \frac{x \left(e^{\frac{2}{x}} - 1 \right) - e^{\frac{2}{x}}}{x\sqrt{e^{\frac{2}{x}} - 1}} = \frac{1}{x\sqrt{e^{\frac{2}{x}} - 1}} \left[x \left(e^{\frac{2}{x}} - 1 \right) - e^{\frac{2}{x}} \right] \\ &= \frac{e^{\frac{2}{x}}}{x\sqrt{e^{\frac{2}{x}} - 1}} \left[x \left(1 - e^{-\frac{2}{x}} \right) - 1 \right] = \frac{e^{\frac{2}{x}}}{\sqrt{e^{\frac{2}{x}} - 1}} \left[\left(1 - e^{-\frac{2}{x}} \right) - \frac{1}{x} \right] \\ &= \frac{e^{\frac{2}{x}}}{\sqrt{e^{\frac{2}{x}} - 1}} g\left(\frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$

b) Dressons le tableau de variations de f :

Problèmes de révision

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{e^{\frac{x}{2}}}{\sqrt{e^x - 1}} g\left(\frac{1}{x}\right) = 0 \Leftrightarrow g\left(\frac{1}{x}\right) = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{x} = a \Leftrightarrow x = \frac{1}{a}$$

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow \frac{e^{\frac{x}{2}}}{\sqrt{e^x - 1}} g\left(\frac{1}{x}\right) > 0 \Leftrightarrow g\left(\frac{1}{x}\right) > 0 \Leftrightarrow 0 < \frac{1}{x} < a \Leftrightarrow x > \frac{1}{a}$$

x	0	$\frac{1}{a}$	$+\infty$
f'(x)	-	0	+
f(x)	$+\infty$	$f\left(\frac{1}{a}\right)$	$+\infty$

c) l'axe $(O, \vec{j})$ est asymptote à la courbe (C) de f.

On a : pour tout $x \geq 2$, $\sqrt{2x} \leq f(x) \leq \sqrt{2x+2e}$

$$\text{donc } \frac{\sqrt{2x}}{x} \leq \frac{f(x)}{x} \leq \frac{\sqrt{2x+2e}}{x} \Leftrightarrow \sqrt{\frac{2}{x}} \leq \frac{f(x)}{x} \leq \sqrt{\frac{2}{x} + \frac{2e}{x^2}}$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{2}{x}} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{2}{x} + \frac{2e}{x^2}} = 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

Et ainsi (C) admet une branche parabolique de direction $(O, \vec{i})$ au voisinage de $+\infty$.

Problèmes de révision

Problème 2 :

A- 1° / a) On a pour tout $x > -1$, $f_1(x) = \frac{e^x}{x+1}$.

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f_1(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x} \cdot \frac{x}{x+1} = +\infty$$

La fonction f_1 est dérivable sur $] -1; +\infty [$ (quotient de deux fonctions

dérivables), et on a : $f_1'(x) = \frac{e^x(1+x) - e^x}{(x+1)^2} = \frac{x e^x}{(1+x)^2}$.

$$f_1'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

Le signe de $f_1'(x)$ est celui de x , d'où le tableau de variation de f_1 :

x	-1	0	+∞
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	+∞ ↘	1	↗ +∞

D'autre part : pour tout $x > -1$, $f_2(x) = \frac{e^x}{(x+1)^2}$.

$$\lim_{x \rightarrow (-1)^+} f_2(x) = +\infty \quad \text{et} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f_2(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} \cdot \frac{x^2}{(x+1)^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} \cdot \left(\frac{1}{1+\frac{1}{x}} \right)^2 = +\infty$$

f_2 est dérivable sur $] -1, +\infty [$ et $f_2'(x) = \frac{e^x(1+x)^2 - 2(x+1)e^x}{(1+x)^4}$

Problèmes de révision

$$\text{d'où } f_2'(x) = \frac{e^x(1+x-2)}{(1+x)^3} = \frac{(x-1)e^x}{(1+x)^3}.$$

$$f_2'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

Le signe de $f_2'(x)$ est celui de $x - 1$, d'où le tableau de variation de f_2 :

x	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	$+\infty$ ↘	$\frac{e}{4}$	↗ $+\infty$

b) Etudions la position de Position de (C_1) et (C_2) :

$$\text{Pour tout } x > -1, f_1(x) - f_2(x) = \frac{xe^x}{(1-x)^2} = \frac{-xe^x}{(1+x)^2}.$$

- Si $x \in]-1, 0[$, on a $f_1(x) - f_2(x) < 0$ donc (C_1) est au dessous de (C_2) .
- Si $x \in]0, +\infty[$, on a $f_1(x) - f_2(x) > 0$ donc (C_1) est au dessus de (C_2) .
- Pour $x = 0$ on a $f_1(x) = f_2(x) = 0$ donc $(C_1) \cap (C_2) = \{(0, 1)\}$.

Etudions les branches infinies à (C_1) et à (C_2) :

La droite d'équation $x = -1$ est une asymptote verticale commune à (C_1) et (C_2) .

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_1(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x(x+1)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^2} \cdot \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{x}} \right) = +\infty.$$

Donc la courbe (C_1) admet une branche parabolique de direction $(\vec{O}, \vec{j})$ au voisinage de $+\infty$.

Problèmes de révision

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f_2(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x(x+1)^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{x^3} \cdot \left(\frac{1}{1 + \frac{1}{x}} \right)^2 = +\infty$$

Donc la courbe (C_2) admet une branche parabolique de direction $(\vec{0}, \vec{j})$ au voisinage de $+\infty$.

c) L'aire en cm^2 de la partie du plan limitée par (C_1) et (C_2) et les droites

d'équations $x = 0$ et $x = 1$ est : $A = \left(\int_0^1 (f_1(x) - f_2(x)) dx \right) \text{ cm}^2 = \int_0^1 \frac{xe^x}{(1+x)^2} dx \cdot 4 \text{ cm}^2$.

On intègre par parties et on pose :

$u(x) = xe^x$	$u'(x) = (x+1)e^x$
$v'(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$	$v(x) = -\frac{1}{1+x}$

Problèmes de révision

On a donc :

$$A = \left(\left[\frac{-xe^x}{1+x} \right]_0^1 + \int_0^1 e^x dx \right) \cdot 4 \text{ cm}^2 = \left(\frac{-e}{2} + e - 1 \right) 4 \text{ cm}^2 = \left(\frac{e}{2} - 1 \right) 4 \text{ cm}^2$$

Ainsi : $A = (2e - 4) \text{ cm}^2$.

2. a) La fonction f_n est dérivable sur $] -1, +\infty [$ et $f'_n(x) = \frac{e^x(x+1-n)}{(1+x)^{n+1}}$.

On a donc : $f'_n(x) = 0 \Leftrightarrow x + 1 - n = 0 \Leftrightarrow x = n - 1$.

Comme $n \in \mathbb{N}^*$ alors $n > 0$ donc $n - 1 > -1$.

x	-1	$n-1$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+

La fonction f_n admet en $(n - 1)$ un minimum absolu sur $] -1; +\infty [$ égal à $u_n = f_n(n - 1)$.

$$\text{b) } \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \ln \left(\frac{e^{n-1}}{n^n} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} n - 1 - n \ln n = \lim_{x \rightarrow +\infty} n(1 - \ln n) - 1 = -\infty$$

Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} e^{\ln u_n} = 0$ d'où $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

B- Pour $x > \frac{1}{e}$, on pose $F(x) = \int_0^{\ln x} f_2(t) dt$

1. La fonction f_2 est continue sur $] -1, \infty [$ et par suite f_2 est continue sur

$$\left] \frac{1}{e}, +\infty \left[\text{ donc } F \text{ est définie sur } \left] \frac{1}{e}, +\infty \left[.$$

2. on a donc pour tout $x > \frac{1}{e}$,

si $0 \leq t \leq \ln x$ alors $1 \leq e^t \leq x$ et comme $(1+t)^2 > 0$ alors

Problèmes de révision

$$\frac{e^t}{(1+t)^2} \leq \frac{x}{(1+t)^2} \quad \text{d'où} \quad \int_0^{\ln x} \frac{e^t}{(1+t)^2} dt \leq \int_0^{\ln x} \frac{x}{(1+t)^2} dt \Leftrightarrow F(x) \leq x \left[-\frac{1}{1+t} \right]_0^{\ln x}$$

$$\text{Ainsi, pour tout } x > \frac{1}{e}, \quad F(x) \leq x \left(1 - \frac{1}{\ln x + 1} \right)$$

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow \left(\frac{1}{e}\right)^+} \ln x + 1 = 0^+ \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow \left(\frac{1}{e}\right)^+} x \left(1 - \frac{1}{\ln x + 1} \right) = -\infty, \quad \text{il en suit :} \quad \lim_{x \rightarrow \left(\frac{1}{e}\right)^+} F(x) = -\infty$$

3. a) On intègre par parties, on pose :

$u(t) = \frac{1}{(1+t)^2}$	$u'(t) = \frac{-2}{(1+t)^3}$
$v'(t) = e^t$	$v(t) = e^t$

$$\text{On a donc } F(x) = \left[\frac{e^t}{(1+t)^2} \right]_0^{\ln x} + 2 \int_0^{\ln x} \frac{e^t}{(1+t)^3} dt = \frac{x}{(1+\ln x)^2} - 1 + 2 \int_0^{\ln x} f_3(t) dt$$

Comme pour tout $x \geq 1$ et pour tout t de $[0, \ln x]$, $f_3(t) \geq 0$ alors $\int_0^{\ln x} f_3(t) dt \geq 0$

$$\text{Donc } F(x) \geq \frac{x}{(1+\ln x)^2} - 1.$$

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln^2 x}{x} = 0^+ \quad \text{donc} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{(1+\ln x)^2} - 1 = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\ln^2 x} \cdot \frac{1}{\left(\frac{1}{\ln x} + 1\right)^2} = +\infty$$

et donc : $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = +\infty.$

4. On a :

✓ la fonction $\ln$ est dérivable sur $\left] \frac{1}{e}, +\infty \right[$

✓ Pour tout x de $\left] \frac{1}{e}, +\infty \right[$, $\ln t \in]-1, +\infty[$

Problèmes de révision

✓ La fonction f_2 est continue sur $] -1, +\infty[$

donc F est dérivable sur $\left] \frac{1}{e}, +\infty \right[$ et on a :

$$F'(x) = \frac{1}{x} f_2(\ln x) = \frac{1}{x} \cdot \frac{x}{(1+\ln x)^2} = \frac{1}{(1+\ln x)^2} > 0$$

D'où F est strictement croissante sur $\left] \frac{1}{e}, +\infty \right[$.

Soit donc le tableau de variation de F :

x	$\frac{1}{e}$	$+\infty$
F'(x)	+	
F(x)	$-\infty$	$+\infty$

Ainsi la fonction F est une bijection de $\left] \frac{1}{e}, +\infty \right[$ sur $\mathbb{R}$.

C- On a pour tout $n \geq 1$, $I_n = \int_0^1 f_n(t) dt$.

$$1. \quad I_{n+1} - I_n = \int_0^1 (f_{n+1}(t) - f_n(t)) dt$$

or pour tout x de $[0, 1]$ et $n \geq 1$, on a : $f_{n+1}(t) - f_n(t) \leq 0$

Donc $\int_0^1 (f_{n+1}(t) - f_n(t)) dt \leq 0$ d'où $I_{n+1} - I_n \leq 0$ et par suite la suite (I_n) est décroissante.

On a pour tout t de $[0, 1]$, $f_n(t) \geq 0$ donc pour tout $n \geq 1$, $I_n = \int_0^1 f_n(t) dt \geq 0$.

Problèmes de révision

Il en résulte que la suite (I_n) est minorée par 0.

Ainsi, (I_n) est décroissante et minorée par 0 donc (I_n) est convergente.

$$2. a) I_n = \int_0^1 f_n(t) dt = \int_0^1 \frac{e^t}{(1+t)^n} dt$$

$$0 \leq t \leq 1 \Leftrightarrow 1 \leq e^t \leq e \Leftrightarrow \frac{1}{(1+t)^n} \leq f_n(t) \leq \frac{e}{(1+t)^n} \text{ donc}$$

$$\int_0^1 \frac{1}{(1+t)^n} dt \leq \int_0^1 f_n(t) dt \leq \int_0^1 \frac{e}{(1+t)^n} dt \Leftrightarrow -\frac{1}{n-1} \left[\frac{1}{(1+t)^{n-1}} \right]_0^1 \leq I_n \leq -\frac{e}{n-1} \left[\frac{1}{(1+t)^{n-1}} \right]_0^1$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{1-n} \left(\frac{1}{2^{n-1}} - 1 \right) \leq I_n \leq \frac{e}{1-n} \left(\frac{1}{2^{n-1}} - 1 \right)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{n-1} \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}} \right) \leq I_n \leq \frac{e}{n-1} \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}} \right)$$

$$c) \text{ On a : } \frac{1}{2} \in]-1, 1[\text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = 0$$

$$\text{d'où } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n-1} \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}} \right) = 0 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{e}{n-1} \left(1 - \frac{1}{2^{n-1}} \right) = 0 \text{ il en suit : } \lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0.$$

$$3. a) \text{ Pour tout } x > -1, f'_n(x) = \frac{e^x(x+1-n)}{(x+1)^{n+1}} = \frac{e^x}{(x+1)^n} - n \frac{e^x}{(x+1)^{n+1}} = f_n(x) - n f_{n+1}(x)$$

$$b) \text{ Il en résulte : } \int_0^1 f'_n(x) dx = \int_0^1 f_n(x) dx - n \int_0^1 f_{n+1}(x) dx = I_n - n I_{n+1}$$

$$\text{donc } I_n - n I_{n+1} = \frac{e}{2^n} - 1 \Leftrightarrow n I_{n+1} = I_n - \frac{e}{2^n} + 1$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow +\infty} I_n = 0 \text{ } I_n = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e}{2^n} = 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} n I_{n+1} = 1.$$

Problèmes de révision

Problème 2 :

Partie A -

1° Pour tout $x \geq 1$, $f_1(x) = \frac{\ln x}{x^2}$

On sait que $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_1(x) = 0$.

f_1 est le quotient de deux fonctions dérivables sur I , elle est définie sur I elle est donc dérivable sur I

$$f_1'(x) = \frac{\frac{1}{x} \times x^2 - 2x \ln x}{x^4} = \frac{x - 2x \ln x}{x^4} = \frac{1 - 2 \ln x}{x^3}$$

Sur I , la fonction $f_1'(x)$ est du signe de $1 - 2 \ln x$

$$1 - 2 \ln x \geq 0 \Leftrightarrow 1 \geq 2 \ln x \Leftrightarrow \ln x \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow x \leq e^{\frac{1}{2}}$$

x	1	$e^{1/2}$	$+\infty$
signe de f_1'	+	0	-
f_1	$0 \nearrow \frac{1}{2e} \searrow 0$		

$$f_1\left(e^{\frac{1}{2}}\right) = \frac{1}{2e}$$

2° La droite des abscisses est asymptote à (C_1) au voisinage de $+\infty$.

3° On pose :

$u(t) = \ln t$	$u'(t) = \frac{1}{t}$
$v'(t) = \frac{1}{t^2}$	$v(t) = -\frac{1}{t}$

On obtient :

$$I_1(x) = \left[-\frac{1}{t} \cdot \ln t \right]_1^x + \int_1^x \frac{dt}{t^2} = -\frac{\ln x}{x} + \left[-\frac{1}{t} \right]_1^x = -\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x} + 1$$

Problèmes de révision

Partie B

1° On sait que pour tout entier naturels n et m , $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\ln x)^n}{x^m} = 0$

Donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0$.

2° a) f_n est la quotient de deux fonctions dérivables sur I , elle est définie sur I elle est donc dérivable sur I .

$$f_n'(x) = \frac{n (\ln x)^{n-1} \times \frac{1}{x} \times x^2 - 2x \times (\ln x)^n}{x^4} = \frac{n (\ln x)^{n-1} \times x - 2x \times (\ln x)^n}{x^4}$$

$$= \frac{(\ln x)^{n-1} (n - 2 \ln x)}{x^3}$$

Pour tout réel x de I $\ln x > 0$ et $x^3 > 0$ donc $f_n'(x)$ est du signe de $n - 2 \ln x$

$$n - 2 \ln x \geq 0 \Leftrightarrow \frac{n}{2} \geq \ln x \Leftrightarrow x \leq e^{n/2}$$

x	1	$e^{n/2}$	$+\infty$
signe de f_n'	+	0	-
f_n	0	$f_n(e^{n/2})$	0

b) La valeur maximale de f_n sur I est : $f_n(e^{n/2}) = \frac{1}{n!} \frac{(\ln(e^{n/2}))^n}{(e^{n/2})^2} = \frac{1}{n!} \frac{\left(\frac{n}{2}\right)^n}{e^n} = \frac{1}{n!} \left(\frac{n}{2e}\right)^n$

3° a) Soit $x \in I$.

$$f_2(x) - f_1(x) = \frac{1}{2!} \times \frac{(\ln x)^2}{x^2} - \frac{\ln x}{x^2} = \frac{\ln x}{x^2} \left(\frac{\ln x}{2} - 1 \right)$$

$$f_2(x) - f_1(x) \geq 0 \Leftrightarrow \frac{\ln x}{2} - 1 \geq 0 \Leftrightarrow \ln x \geq 2$$

$$\Leftrightarrow x \geq e^2$$

x	1	e^2	$+\infty$
$f_2(x) - f_1(x)$	-	0	+

Problèmes de révision

b) $f_2(1) = \frac{(\ln 1)^2}{1^2} \times \frac{1}{2} = 0$ et $f_1'(1) = \frac{(\ln 1)^{2-1} (2 - 2 \ln 1)}{1^3} = 0$ L'équation de la tangente est donc $y = 0$.

4°

a) Pour $x > 1$, $\frac{f_{n+1}(x)}{f_n(x)} = \frac{1}{(n+1)!} \times \frac{(\ln x)^{n+1}}{x^2} \times (n!) \times \frac{x^2}{(\ln x)^n} = \frac{\ln x}{n+1}$

b) $y_{n+1} = \frac{1}{(n+1)!} \left(\frac{n+1}{2e}\right)^{n+1} = \frac{1}{n!} \times \frac{1}{2e} \left(\frac{n+1}{2e}\right)^n$

$$f_n\left(e^{\frac{n+1}{2}}\right) = \frac{1}{n!} \times \frac{\left(\ln\left(e^{\frac{n+1}{2}}\right)\right)^n}{\left(e^{\frac{n+1}{2}}\right)^2} = \frac{1}{n!} \times \frac{\left(\frac{n+1}{2}\right)^n}{e^{n+1}} = 2 y_{n+1}$$

$e^{\frac{n+1}{2}} \geq e^{\frac{n}{2}}$ donc $f_n\left(e^{\frac{n+1}{2}}\right) \leq f_n\left(e^{\frac{n}{2}}\right)$ car la fonction f_n est décroissante sur $\left[e^{\frac{n}{2}}, +\infty\right[$

$$\text{donc } y_{n+1} \leq \frac{1}{2} f_n\left(e^{\frac{n+1}{2}}\right) \leq \frac{1}{2} y_n \quad \text{car } f_n\left(e^{\frac{n}{2}}\right) = y_n$$

c) Montrons par récurrence que : pour tout n de $\mathbb{N}^*$, $y_n \leq \frac{1}{e} \frac{1}{2^n}$

$$\text{On a : } y_1 = \frac{1}{2e} \leq \frac{1}{e} \times \frac{1}{2^1}.$$

On suppose que : $y_k \leq \frac{1}{e} \frac{1}{2^k}$ pour $k \geq 1$, et on montre que $y_{k+1} \leq \frac{1}{e} \frac{1}{2^{k+1}}$

$$\text{Comme } y_{k+1} \leq \frac{1}{2} y_k \leq \frac{1}{2} \times \frac{1}{e} \times \frac{1}{2^k}. \text{ On a donc bien } y_{k+1} \leq \frac{1}{e} \frac{1}{2^{k+1}}$$

Conclusion : pour tout n de $\mathbb{N}^*$, $y_n \leq \frac{1}{e} \frac{1}{2^n}$.

On a pour tout n de $\mathbb{N}^*$, $0 \leq y_n \leq \frac{1}{e} \frac{1}{2^n}$.

$$\frac{1}{2} \in]-1, 1[\text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{e} \cdot \frac{1}{2^n} = 0 \text{ d'où } \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = 0.$$

Problèmes de révision

Partie C -

1° a) Soit $n \geq 1$ un entier. On pose :

$u(t) = \frac{(\ln x)^{n+1}}{(n+1)!}$	$u'(t) = (n+1) \cdot \frac{1}{t} \cdot \frac{(\ln x)^n}{(n+1)!} = \frac{(\ln t)^n}{n!} \cdot \frac{1}{t}$
$v'(t) = \frac{1}{t^2}$	$v(t) = -\frac{1}{t}$

On obtient :

$$I_{n+1} = \left[-\frac{1}{t} \cdot \frac{(\ln t)^{n+1}}{(n+1)!} \right]_1^x - \int_1^x \frac{(\ln t)^n}{n!} \cdot \frac{1}{t} \cdot \left(-\frac{1}{t} \right) dt = -\frac{1}{x} \cdot \frac{(\ln x)^{n+1}}{(n+1)!} + \frac{1}{n!} \int_1^x \frac{(\ln t)^n}{t^2} dt$$

On a donc bien $I_{n+1}(x) = I_n(x) - \frac{1}{(n+1)!} \frac{(\ln x)^{n+1}}{x}$.

b) Démontrons par récurrence que pour tout entier $n \geq 1$,

$$I_n(x) = 1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} - \frac{(\ln x)^2}{2!x} - \dots - \frac{(\ln x)^{n-1}}{(n-1)!x} - \frac{(\ln x)^n}{n!x}$$

On a démontré que : $I_1(x) = 1 - \frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}$.

On suppose que : $I_n(x) = 1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} - \frac{(\ln x)^2}{2!x} - \dots - \frac{(\ln x)^{n-1}}{(n-1)!x} - \frac{(\ln x)^n}{n!x}$, pour $k \geq 1$.

$$I_{n+1}(x) = I_n(x) - \frac{1}{(n+1)!} \frac{(\ln x)^{n+1}}{x} = 1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} - \frac{(\ln x)^2}{2!x} - \dots - \frac{(\ln x)^{n-1}}{(n-1)!x} - \frac{(\ln x)^n}{n!x} - \frac{1}{(n+1)!} \frac{(\ln x)^{n+1}}{x}$$

Ainsi le résultat est démontré.

2° Soit $\alpha \geq 1$ un nombre réel fixé.

a)

Pour tout réel t de $[1, \alpha]$, $0 \leq f_n(t) \leq y_n$ On peut intégrer les inégalité (ou utiliser l'inégalité de la moyenne)

On obtient : $0 \times (\alpha - 1) \leq \int_0^\alpha f_n(t) dt \leq (\alpha - 1) y_n$ donc $0 \leq I_n(\alpha) \leq (1 - \alpha) y_n$

Problèmes de révision

b)

On a vu au B 4° a) que $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = 0$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\alpha - 1) y_n = 0$

D'après le théorème des gendarmes on a donc : $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n(\alpha) = 0$

3° Pour $n \geq 1$ et $x \geq 1$ on pose : $W_n(x) = 1 + \frac{\ln x}{1!} + \frac{(\ln x)^2}{2!} + \dots + \frac{(\ln x)^n}{n!}$

a) Exprimons $W_n(x)$ en fonction de $I_n(x)$:

$$\begin{aligned} I_n(x) &= 1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} - \frac{(\ln x)^2}{2!x} - \dots - \frac{(\ln x)^{n-1}}{(n-1)!x} - \frac{(\ln x)^n}{n!x} \\ &= 1 - \frac{1}{x} \left(\frac{\ln x}{1!} + \frac{(\ln x)^2}{2!} + \dots + \frac{(\ln x)^{n-1}}{(n-1)!} + \frac{(\ln x)^n}{n!} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{x} \cdot W_n(x) \end{aligned}$$

Donc $\frac{1}{x} W_n(x) = 1 - I_n(x)$ d'où $W_n(x) = x(1 - I_n(x))$

b) $\alpha \geq 1$ étant un nombre réel fixé.

On a vu que $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n(\alpha) = 0$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha(1 - I_n(\alpha)) = \alpha = \lim_{n \rightarrow +\infty} W_n(\alpha)$

c) On désigne par γ la limite de la suite $(U_n)_{n \geq 1}$ de terme général : $U_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$.

$U_n = W_n(e)$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} W_n(e) = e = \gamma$

$U_6 \approx 2,7181$ et $\gamma \approx 2,7183$.