Exercice 1 : b) ; c) ; c)

Exercice 2 :

1. a) -2 est la solution réelle de (E).

$$b) (E) \Leftrightarrow (z+2)(z^2 + (3+i)z + 4) = 0 \Leftrightarrow z = -2 \text{ ou } z^2 + (3+i)z + 4 = 0$$

$$\Delta = -8 + 6i = (1 + 3i)^2$$

L'ensemble de solutions de (E) est $\{-2, -1 - i, -2 - 2i\}$.

2. a) $1 + i = \left[\sqrt{2}, \frac{\pi}{4}\right]$ donc f est la similitude directe de centre O, de rapport $\sqrt{2}$ et d'angle $\frac{\pi}{4}$.

$$b) M \neq O, M' = f(M) \Leftrightarrow OM' = \sqrt{2}OM \text{ et } \left(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}\right) \equiv \frac{\pi}{4} [2\pi]$$

$$MM'^2 = OM^2 + OM'^2 - 2OM \cdot OM' \cos \frac{\pi}{4} = OM^2.$$

Donc OMM' est isocèle rectangle en M.

La perpendiculaire en M à la droite (OM) coupe le cercle de centre O et de rayon OM en M et M'' tel que OMM' soit un triangle de sens direct.

3.a) $z_0 = -1 + i, z_1 = -2, z_2 = -2 - 2i, z_3 = -4i$ et $z_4 = 4 - 4i$.

b) On démontre par récurrence que : pour tout n de $\mathbb{N}, z_n = (1+i)^n \cdot z_0$.

$$O, A_0 \text{ et } A_n \text{ sont alignés} \Leftrightarrow \left(\overrightarrow{OA_0}, \overrightarrow{OA_n}\right) = k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow \arg \left(\frac{z_n}{z_0} \right) = k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow n \cdot \arg(1+i) = k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow n \frac{\pi}{4} = k\pi, k \in \mathbb{Z}$$

D'où $n = 4k, k \in \mathbb{N}$.

Exercice 3 :

1.a) $AB = BD$ et $A \neq B$ donc il existe un unique antidéplacement f qui transforme A en B et B en D.

$$b) f \circ f(A) = f(B) = D \neq A \text{ donc } f \circ f \neq \text{Id}_p.$$

f est un antidéplacement différent de Id_p donc f n'est pas une symétrie orthogonale d'où f est une symétrie glissante.

$$\text{Soit } \vec{u} \text{ le vecteur de } f, f \circ f = t_{\vec{u}} \text{ donc } 2\vec{u} = \overrightarrow{AD} \Leftrightarrow \vec{u} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AD} \Leftrightarrow \vec{u} = \overrightarrow{AJ}.$$

Soit Δ l'axe de f.

$f(A) = B$ donc I, milieu de [AB] appartient à (Δ).

$f(B) = D$ donc O milieu de $[BD]$ appartient à (Δ) . $I \neq O$ donc $\Delta = (OI)$.

c) Soit $D' = f(D)$, ABD est un triangle équilatéral direct donc $f(ABD) = BDD'$ est un triangle équilatéral indirect. Comme BDC est un triangle équilatéral indirect alors $f(D) = D' = C$.

2. a) On a : $\sigma(A) = C$ et ABD est un triangle équilatéral direct.

- si $\sigma(B) = B$ alors $\sigma(D) = D$ et comme CDB est un triangle équilatéral indirect, on conclue que :

$$\sigma([BD]) = [BD].$$

- si $\sigma(B) = D$ alors $\sigma(D) = B$: impossible car CDB est direct.

b) σ est un antidéplacement fixant B et D donc $\sigma = S_{(BD)}$.

3. a) – si $g(A) = D$ alors $g(D) = B$ ou $g(D) = C$.

Supposons que $g(A) = D$ et $g(D) = C$ alors $g(B) = B$. Impossible car ABD et DBC de même sens.

Donc $g(D)$.

b) ... g est une symétrie glissante de vecteur $\frac{1}{2}\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AI}$ et d'axe (JO) .

Exercice 4

1. a) $\lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = 0 = f(-2)$ donc f est continue à droite en (-2) .

$$b) \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{f(x) - f(-2)}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -2^+} \ln(x + 2) = -\infty.$$

c) Pour tout x de $] -2, 2]$, $f'(x) = \ln(x + 2) + 1$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \ln(x + 2) = -1 \Leftrightarrow x = e^{-1} - 2.$$

x	-2	$e^{-1} - 2$	2
$f'(x)$		-	0
$f(x)$	0	$-e^{-1}$	$4 \ln 4$

2. a) Pour tout x de $] -2, 2]$, $f(x) - g(x) = x\sqrt{4 - x^2}$.

(C) est au dessous de (C') sur $] -2, 0]$ et (C) est au dessus de (C') sur $[0, 2]$.

$$C \cap C' = \{A(0, 2 \ln 2)\}$$

b) Voir figure.

$$3. a) \text{ Si } \alpha > 0 : A_\alpha = \int_0^\alpha (f(x) - g(x)) dx = \int_0^\alpha x\sqrt{4 - x^2} dx.$$

Si $\alpha < 0$: $A_\alpha = \int_\alpha^0 (g(x) - f(x)) dx = \int_\alpha^0 -x\sqrt{4-x^2} dx = \int_0^\alpha x\sqrt{4-x^2} dx$.

b) $A_\alpha = -\frac{1}{2} \int_0^\alpha -2x\sqrt{4-x^2} dx = -\frac{1}{2} \left[\frac{2}{3} (4-x^2)\sqrt{4-x^2} \right]_0^\alpha = \frac{8}{3} - \frac{1}{3} (4-\alpha^2)\sqrt{4-\alpha^2}$.

c) L'aire de la partie du plan délimitée par les deux courbes C et C' est $A_{-2} = \frac{8}{3}$.

Exercice 5 :

1. Pour tout x de $[0, 1]$, $f_n'(x) = -e^{-x} - (2n+1)x^{2n} < 0$.

x	0	1
$f_n'(x)$	-	
$f_n(x)$	1	$e^{-1} - 1$

2. f_n est continue et strictement décroissante sur $[0, 1]$ donc f_n réalise une bijection de $[0, 1]$ sur $f_n([0, 1]) = [e^{-1} - 1, 1]$.

$e^{-1} - 1 < 0$ donc l'équation $f_n(x) = 0$ admet une solution unique u_n dans $]0, 1[$.

3. a) Pour tout n de $\mathbb{N}^*$, $0 < x < 1 \Rightarrow x^{2n+1} < x^{2n} \Rightarrow f_{n+1}(x) < f_n(x)$.

b) Pour tout n de $\mathbb{N}^*$, $u_{n+1} \in]0, 1[$ donc $f_n(u_{n+1}) < f_{n+1}(u_{n+1}) \Leftrightarrow f_n(u_{n+1}) < 0$.

c) Pour tout n de $\mathbb{N}^*$, $u_n \in]0, 1[$ et $f_n(u_{n+1}) < 0 \Leftrightarrow f_n(u_{n+1}) < f_n(u_n)$.

Comme f_n^{-1} est strictement décroissante sur $[e^{-1} - 1, 1]$ alors $u_{n+1} > u_n$.

Ainsi, la suite (u_n) est croissante et majorée par 1 donc convergente.

4. a) Pour tout $n \geq 1$, $f_n(u_n) = 0 \Leftrightarrow e^{-u_n} - u_n^{2n+1} = 0 \Leftrightarrow e^{-u_n} = u_n^{2n+1} \Leftrightarrow -u_n = (2n+1)\ln(u_n)$

$$\Leftrightarrow \ln(u_n) = -\frac{u_n}{2n+1}$$

b) Soit $\ell = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \ln(u_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} -\frac{1}{2n+1} \cdot u_n \Leftrightarrow \ln(\ell) = 0 \Leftrightarrow \ell = 1$.